

# Diazepam

## ◆ 醫生為何開此藥給我？

1. Diazepam可用來舒緩焦慮、肌肉痙攣及癲癇，還能控制因酒精戒斷所引起的躁動。
2. 此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

## ◆ 該如何使用此藥品？

1. Diazepam是口服錠劑，通常一天服用一至四次，空腹或與食物併服均可。
2. 請配合醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
3. 未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。應該尋求醫師指示，不可自行增加劑量。
4. Diazepam具有成癮性，服用此藥不可突然停藥，如果要停藥的話，應該依循醫師的指示，漸漸降低服藥的劑量或次數，然後再停藥。

## ◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，請告訴醫師或藥師：

1. 您正在服用的藥品(包含非處方藥)，特別是抗組織胺劑、cimetidine、

digoxin、disulfiram、fluoxetine、isoniazid、ketoconazole、levodopa、metoprolol、probenecid、propoxyphene、propranolol、ranitidine、rifampin、theophylline、valproic acid、維他命；治療巴金氏症的藥品、避孕藥、鎮靜安眠藥、肌肉鬆弛劑、抗過敏藥、感冒藥、抗抑鬱藥、止痛藥等。同時服用這些藥品時，可能會增加diazepam的嗜睡作用。

2. 您是否對diazepam、alprazolam、chlordiazepoxide、clonazepam、clorazepate、estazolam、flurazepam、lorazepam、oxazepam、prazepam、temazepam、triazolam或其他藥品有過敏的反應。
3. 請告訴醫師您目前或曾有過的疾病，如：是否有青光眼、痙攣、肝臟、心臟或肺臟疾病。
4. 如果您將要進行手術(包含牙科手術)，要記得告訴醫師或牙醫師您正在使用diazepam。
5. 您必須知道這個藥可能會導致昏昏欲睡，在您未清楚藥品可能對您造成影響前，請不要開車或操作危險機械。
6. 請告訴醫師您是否有抽菸，吸菸會降低此藥的藥效。

## ◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

若在服藥一小時內想起，立刻補服一個劑量；但若超過一小時，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

## ◆ 此藥會造成什麼副作用？

1. Diazepam常見的副作用有：嗜睡、暈眩、疲倦、虛弱、口乾、腹瀉、胃腸不適及食慾改變。
2. 若是有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請告知您的醫師：煩躁不安或興奮、便秘、小便困難、視覺模糊、性能力改變。
3. 若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：痙攣、拖步走路、無法靜坐、發燒、呼吸或吞嚥困難、嚴重皮膚紅疹、眼睛及皮膚發黃、不規則的心跳。

## ◆ 此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於小孩拿不到的地方。將藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和避免直接的陽光照射。過期或不再需要的藥品應丟棄。將錠劑收集至夾鏈袋中，可隨一般垃圾清除。

## ◆ 我還應知道什麼其他資訊？

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查，以確定您對本藥的反應。
2. 不要讓任何人服用您的藥品。

★ 孕婦用藥等級及注意事項

此藥可能會傷害您未出生的胎兒，懷孕婦女不建議使用；若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師。(孕婦用藥等級：D)

★ 嬰兒哺乳等級及注意事項

不建議於授乳期間使用本品，最好能改用其他乳製品以代替母乳。若您給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。

★ 我該遵守什麼飲食注意事項？

酒精會加重此藥導致的嗜睡作用，服藥期間不可飲酒。

守護健康、守護生命、守護愛



佛教慈濟  
醫療財團法人 台北慈濟醫院  
Taipei Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation



病人用藥指導卡

**Diazepam**

靜思小語：  
付出當下，福已在其中。

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口  
諮詢電話：(02)6628-9779 轉  
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

各院區藥物諮詢電話：  
台北(02) 6628-9779 轉 2150  
花蓮(03) 856-1825 轉 3345  
大林(05) 264-8000 轉 5384  
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

指導卡並無法詳盡 **Diazepam** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。

台北慈濟醫院藥學部 關心您