

Flunitrazepam

◆ 商品名：

Modipanol 1mg/tab (美得眠 膜衣錠)

◆ 醫生為何開此藥給我？

1. Flunitrazepam作用有舒緩焦慮、安眠、肌肉鬆弛等。
2. 有時候此藥還有用於其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆ 該如何使用此藥品？

1. Flunitrazepam通常在睡前服用。服用次數及每次劑量請遵照醫師的指示用藥，如果對於藥品有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
2. 如果服藥後還是有睡眠障礙請告訴醫師，醫師會判斷這藥品是否適合您。
3. 服用此藥可能有依賴性，未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
4. 未經醫師指示不可突然停藥，突然停藥的話可能會造成戒斷症狀(焦慮、失眠、易怒)，因此如果要停藥時，醫師通常會慢慢減低藥品的劑量。在慢慢停藥的第一天及第二天可能會睡眠困難。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 flunitrazepam、alprazolam、chlordiazepoxide、clonazepam、clorazepate、diazepam、estazolam、lorazepam、oxazepam、prazepam、temazepam、triazolam或其他藥品過敏。
2. 請告訴醫師或藥師，您正在使用的藥品(包括非處方藥)，尤其是抗凝血藥、抗過敏藥、cimetidine、digoxin、disulfiram、isoniazid、抗憂鬱劑、癲癇用藥、帕金森症用藥、氣喘用藥、肌肉鬆弛劑、口服避孕藥、probenicid、rifampin、鎮靜劑、安眠藥、theophylline、維他命。這些藥品可能會加強藥品安眠的作用。
3. 請告訴醫師，是否您目前或曾有過病史，如：青光眼、癲癇、肝臟、肺臟、心臟等問題。
4. 如果您將進行手術(包含牙科手術)，記得告訴醫師或牙醫師您正在使用的藥品。
5. 如果有抽菸要告訴醫生，抽菸可能會降低藥品的作用。
6. 這個藥品可能會導致嗜睡，在您未清楚藥品可能對您造成影響前，不要開車或操作危險機械。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

按時服用下次的劑量，不要補服遺漏的劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

1. Flunitrazepam常見的副作用：頭痛、胃灼熱、腹瀉、頭暈、嗜睡、虛弱、口乾。
2. 若是有以下的症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請儘快通知您的醫師：便秘、排尿不順、頻尿、視線模糊。
3. 若您有下列任何一種症狀，請立刻就醫：抽筋、言語困難、皮膚癢紅疹、震顫、發熱、呼吸或吞嚥困難、眼睛或皮膚發黃、心跳不正常。

◆ 此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於小孩拿不到的地方。將藥品儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和避免直接的陽光照射。過期或不再需要的藥品應丟棄。請教藥師如何適當地處理此藥。

◆ 我還應知道什麼其他資訊？

1. 要定期回診，您的醫師可能會幫您做一些檢查來確定您對於本藥的反應，必要時讓醫生為您調整劑量。
2. 不要讓任何人服用您的藥品。

★ 孕婦用藥等級及注意事項

若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師。(孕婦用藥等級：D)

★ 嬰兒哺乳等級及注意事項

若您給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。

★ 我該遵守什麼飲食注意事項？

1. 葡萄柚汁可能會影響藥品作用。
2. 酒精會加重藥品導致的嗜睡作用，服用此藥期間請勿飲酒。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡

靜思小語：
付出當下，福已在其中。

**Flunitrazepam
(Modipanol®)**

指導卡並無法詳盡 **Flunitrazepam** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150
花蓮(03) 856-1825 轉 3345
大林(05) 264-8000 轉 5384
潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口
諮詢電話：(02)6628-9779 轉
2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您