

Chloral Hydrate

◆ 商品名：

Chloral Hydrate solution

水合三氯乙醛(100 mg/mL, 30 mL/bot)

◆ 醫生為何開此藥給我？

Chloral Hydrate為檢查用鎮靜安眠藥。有時候此藥還有用於其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

◆ 該如何使用此藥品？

1. 需按照醫師的指示來使用，未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
2. 如果對於藥品有任何疑問，應詢問醫師或藥師。

◆ 使用時我該注意的特別事項？

在服用此藥前，

- 請告訴醫師或藥師，您是否對Chloral hydrate或其他藥品過敏。
- 請告知醫師與藥師您正在使用的藥品（包含處方藥、非處方藥、天然滋補

品、維他命劑）特別是抗凝血劑。

- 請告知醫師與藥師您目前或曾有過的疾病，如腎臟疾病、肝臟疾病、食道問題、胃部或腸子問題（如腫脹、潰瘍或刺激）。

使用期間，

- 告訴牙醫、外科醫師和其他醫師，您正在使用此藥。
- 服用此藥後且在尚未完全清醒的情況下，應避免駕駛、進行其他需要您提高警覺性的工作或活動。
- 降低頭暈或昏厥的機率，坐姿或躺姿幾分鐘後應非常緩慢地站起。爬樓梯時須小心。
- 須避免飲酒。

◆ 忘記服用一個劑量時，該怎麼辦呢？

若您定期服用，當忘記服用一個劑量時，儘可能在您想起時立刻補服，若已接近下次吃藥的時間，就略過此次劑量，並繼續按照原本的用藥方式。不要為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 此藥會造成什麼副作用？

雖然此藥導致的副作用並不常見，但還是可能發生。

- 若有以下的症狀發生，症狀嚴重的情形或無法消除時，請儘快通知您的醫師：眩暈、隔天嗜睡、噁心或嘔吐、腹瀉或稀便。
- 若您有下列任何一種症狀，請立刻就醫：過敏反應(出疹；蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨發燒；喘鳴；胸口或喉嚨緊繃；難以呼吸或說話；嗓音異常嘶啞；或嘴巴、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹)、無法排尿或排尿量改變、嚴重腹痛、平衡感的改變、在清晰思維和符合邏輯思維方面發生顯著改變、夢遊。

◆ 此藥儲存時的條件為何？

本藥品開封後冷藏保存可放14天。

◆ 我還應知道什麼其他資訊？

依照醫師跟您說的時間定期回診。不要讓任何人服用您的藥品。

◆(準備)懷孕婦女注意事項：

若您已懷孕或計劃準備懷孕，就診時請務必告知醫師。如您正以母乳餵哺幼兒，也請告知醫師。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡



Chloral hydrate

水合三氯乙醛

靜思小語：
付出當下，福已在其中。

各院區藥物諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(02)6628-9779 轉

2150(日)、8912(日)、2155 (24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您

指導卡並無法詳盡 **Chloral hydrate** 的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問，請諮詢醫師或藥師，我們將竭誠為您服務。