



肝癌簡介

定義：

肝細胞突變，成為不停分裂狀態，逐漸破壞正常的肝組織，甚至轉移身體其他器官，進而破壞之，最後危及生命。

流行狀況：

肝癌是台灣癌症死亡率最高的疾病。B肝引起肝癌男性佔八成左右，40至60歲最多，也有不到10歲的。C肝引起的肝癌男女差不多，多50歲以上。

肝癌之原因：

B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、酒精、黃麴毒素、血色素沉積症等，均可能引起肝癌，其中最多的就是B肝及C肝。

肝癌之生長速率：

因人而異，最快一個月增加一倍，最慢一年才增加一倍。

肝癌之症狀：

1. 初期沒有症狀，要撐開肝外膜材會痛，有時到末期很痛，但都可以藥物控制。
2. 有時長到膽管內造成黃疸。
3. 有時長到血管內再長到心臟造成心衰竭。

4. 有時造成不明原因發燒。
5. 有時突然破裂，造成急性腹痛、腹腔內出血、休克。
6. 有時只是肝臟不停長大，上腹部摸到腫塊。
7. 會加重肝硬化的表現，造成肝衰竭。
8. 有時肝臟本身無症狀，倒是轉移到腦部造成類似中風的症狀、轉移到骨頭造成骨折或疼痛，轉移到胸部造成咳嗽或氣喘。

肝癌之死因：

1. 肝癌逐漸長大，壓迫腸胃，吃不下，營養不良，衰竭而死。
2. 肝癌突然破裂，休克致死。
3. 肝癌或合併肝硬化引起食道靜脈瘤破裂、吐血。
4. 腹水難以控制，導致感染、敗血症、腎衰竭。
5. 肝昏迷。
6. 被轉移器官之衰竭，如腦轉移、心衰竭、呼吸衰竭。
7. 其他併發症。

肝癌之程度：

早期肝癌指3至5公分以下之小腫瘤，通常無症狀，可以開刀或其他治療。有症狀之肝炎通常較大，或侵犯膽管、血管或其他器官，大部份來不及開刀治療，但仍可能有減輕痛苦或延長生命之治療。另外肝癌常合併肝硬化，肝硬化之程度也會影響肝癌之預後。

肝癌之治療：

1. 開刀切除：必須沒有轉移，沒有侵犯大血管，沒有肝衰竭，剩餘的肝夠用。
2. 酒精注射：必須小於3公分，至多3個，沒有太多腹水，沒有轉移，沒有侵犯大血管，血液凝固正常。
3. 高周頻電燒治療：必須小於3公分，至多3個，沒有太多腹水，沒有轉移，沒有侵犯大血管，血液凝固正常。
4. 肝動脈栓塞：必須沒有侵犯大血管，沒有肝衰竭，血液凝固正常。
5. 標靶藥物、免疫藥物治療：為治療晚期肝癌的標準治療，並可協同前述各種治療來增加療效。
6. 放射治療與化學治療：肝癌的治療需在各科醫師的合作下才能達到最好的療效，請與您的主治醫師詳細討論。

肝癌之預防：

預防B肝及C肝，少喝酒。

若有任何問題請於週一至週五上午0830~1730 週六上午0830~1200

電洽門診諮詢室電話：(02)6628-9779轉2236