



■ 發行人：趙有誠 ■ 總編輯：吳大圩 ■ 執行編輯：藥品資訊股

目錄

- 藥品異動 10410-10411 新增、停用品項..... 第 1 頁
- 藥物警訊 10406-10411 衛生福利部公布用藥安全警訊..... 第 3 頁
- 醫藥新知 冬令談補—人參與黃耆於補氣方面的運用..... 第 5 頁
- 藥物 Q&A 10410-10411 藥物諮詢分享..... 第 6 頁



台北慈濟藥訊

藥品異動

10410-10411 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛部核准適應症
Tofacitinib 5 mg/tab (XELJANZ)	類風濕性關節炎。
Supremon 0.105 mg/spray, 100 spray/vial (Buserelin)	前列腺癌。
Cetrotide 0.25 mg/vial (Cetrorelix acetate)	預防接受卵巢強效刺激排卵治療的患者早發性的排出不成熟卵。
Orgalutran 0.25 mg/0.5 ml/amp (Ganirelix)	預防以刺激排卵的女性過早達到黃體形成激素高峰(LH SURGE)。
Estrade 2 mg/tab (Estradiol)	更年期症狀及停經後引起的各種病症、卵巢切除之患者（因疾病或腫瘤而將卵巢切除）。
Anvita 20 mL/amp (Vit B1,B6,B12)	神經痛、神經炎、營養不良、貧血、腳氣病的治療預防。
Flusalic Oint 15 gm/tube (Flumethasone & Salicylic acid)	急慢性發炎之皮膚疾患、濕疹、神經性皮炎、扁平苔癬、紅斑性狼瘡、牛皮癬、魚鱗癬。
RECEF-A 1 gm/vial (Cephadrine Arginine, Na free)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌，及其他具有感受性細菌所引起之感染症。
PG2 Injection 500 mg/vial	適用於癌症末期因疾病進展所導致中重度疲勞症狀之改善。
Herbiron Oral Solution 50 ml/bot	緩解缺鐵性貧血症狀及經期不適症狀。

停用品項

藥名	衛部核准適應症
Pecolin (Kaolin & Pectin)120 ml/bot	暫時緩解輕微或中度急性腹瀉。
UBURN Cream 500 g/bot (Silver Sulfadiazine)	局部殺菌劑，預防及治療一般外傷、燙傷及皮膚之感染。
Glycal-Amin 500 mL/bot (Amino acid & Electrolyte)	不能攝取適當食物之患者之補助治療劑、蛋白質之消化吸收機能及合成利用障礙、嚴重創傷、火傷、骨折時蛋白質之補給、蛋白質攝取減少之營養失調症。
Felinamin 10 mL/amp (Vit B1,B6,B12)	神經痛、神經炎、營養不良、貧血、腳氣病的治療及預防。
Cefa 1 g/vial (Cefazolin Na)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
SS Oint 10 gm/tube (Salic, Salicylic Acid)	去角質。
Ascorbic Acid 50 mg/tab (Vit C)	壞血病、齒齦出血、維他命 C 缺乏症。
Viramune 200 mg/tab (Nevirapine)	與其他藥物併用、治療免疫缺陷逐漸惡化或嚴重 HIV-1 感染之成年病患。

藥品分類	本院藥名	用藥安全警訊內容
Immunological Agents	Human Immunoglobulin (Human Immunoglobulin for intravenous use [®])	研究顯示含 non-hyperimmune 類 human immune globulin 成分藥品不論使用劑量多寡、投予途徑為何（靜脈注射、肌肉注射或皮下注射），或使用是否具血栓危險因子，皆具有潛在之血栓風險。104.06.15
Cardiovascular-Renal Drugs	Amiodarone (Cordarone [®] Tablet、Injection)	FDA 發布含 amiodarone 成分之藥品與抗 C 型肝炎藥 Harvoni [®] (ledipasvir / sofosbuvir) 併用，或與 Sovaldi [®] (sofosbuvir) 加上另一個抗病毒藥品（例如 daclatasvir 或 simeprevir）併用時，可能發生嚴重之心跳速率減慢之安全性資訊。104.06.18
	Ginkgo Biloba(Schnin [®])	含銀杏葉抽出物成分口服劑型藥品，經評估認為仿單應加刊及修訂事項： （一）禁忌加刊懷孕。（二）警語及注意事項加刊手術出血風險、不良反應。（三）特殊族群加刊癲癇病人。（四）藥品交互作用 1. 與抗凝血劑或抗血小板藥品併用可能會影響抗凝血劑或抗血小板藥品之作用。2. 與 warfarin 合併使用時，建議進行凝血功能監測。3. 可能增加 P-gp 受質藥品暴露。（五）刪除仿單中所有與核准適應症無關之描述。104.09.01
	Cabudan [®] 、Amtrel [®] 、 Tanatril [®] 、Preterax [®] 、 Syntace [®] 、Exforge [®] 、 Diovan [®] 、Blopress [®] 、 Aprovel [®] 、Hyzaar [®] 、 Olmetec [®] 、Sevikar [®] 、 Micardis [®] 、Rasilez [®]	合併使用 ACEIs、ARBs 或含 aliskiren 成分藥品會增加低血壓、高鉀血症及腎功能下降（包括急性腎衰竭）之風險。為確保病人用藥安全，經彙集國內、外相關資料及臨床相關文獻報告進行整體性評估後認為，作用於 RAAS 之藥品仿單應修訂內容。104.09.11
Drug Used for Relief of Pain & Inflammation	Ibuprofen(Ibuprofen [®] Susp.、NeoProfen [®])	PRAC 建議患有潛在心臟或循環系統疾病者，應避免使用高劑量 ibuprofen 以降低心血管風險。若需長期服用（特別是高劑量）時，醫生應於開始治療前謹慎評估病人心臟或循環系統疾病之風險因子。目前仍無法確認臨床上長期使用 ibuprofen 會降低 aspirin 預防心臟病發作及中風的效用。104.06.18
	Celebrex [®] 、Voren [®] 、Voltaren SR [®] 、Volna-K [®] 、TIE SHR SHU PAP [®] 、Ibuprofen [®] 、 NeoProfen [®] 、Laston [®] 、 Keto [®] 、Mobic [®] 、Meloxin [®] 、 Naprosin [®] 、Toricam [®] 、Piroxim [®]	美國 FDA 發布將對 aspirin 以外之非類固醇類抗發炎劑類藥品可能增加心臟病發作或中風之風險加強警示。104.08.12

Gastrointestinal Agents	Esomeprazole (Nexium [®] Tablet、Injection)、Pantoprazole(Pantoloc [®])、Rabeprazole (Pariet [®])、Dexlansoprazole (Dexilant [®])	研究發現一年內有使用口服氫離子幫浦抑制劑者，有較高感染沙門氏桿菌的風險，而正在使用者的感染風險又更高。104.07.24
Hematological Agents	Clopidogrel (Plavix [®])	全國藥物不良反應通報中心接獲數件疑似因使用含 clopidogrel 成分藥品引起 SJS/TEN/DRESS 之案例且部分嚴重個案後果為死亡。104.07.31
Psychopharmacologic Drugs	Clozapine(Zapine [®])	全國藥物不良反應通報中心接獲疑似因使用含 clozapine 成分藥品引起腸蠕動功能障礙之案例，其中兩例分別因嚴重腸阻塞與缺血性腸症而致死。104.07.31
Hormones & Agents Affecting Hormonal Mechanism	Bromocriptine(Volbro [®])	含 bromocriptine 成分藥品用於產後抑制泌乳之嚴重或致命之不良反應報告增加，尤其是心血管、神經和精神相關副作用。104.08.03
	Sitagliptin (Januvia [®])、Linagliptin(Trajenta [®])、Vildagliptin & Metformin (Galvus Met [®])	FDA 發現與使用 DPP-4 抑制劑類藥品相關之嚴重關節痛的通報案例。關節疼痛症狀可能出現於開始使用藥品的第一天至數年後，且通常於停藥後一個月內緩解。有些病人於停藥後再次使用 DPP-4 抑制劑類藥品會再度出現嚴重關節疼痛的症狀。104.10.30
Psychopharmacologic Drugs	Midazolam(Dormicum [®])	全國藥物不良反應通報中心接獲疑似因使用含 midazolam 成分針劑藥品發生呼吸抑制之死亡通報案例。使用含 midazolam 成分針劑藥品時，應備有適當之復甦設備及受過急救相關訓練之醫療人員，並確實依仿單所列不同適應症之建議用法用量給藥；病人用藥後應密切監視其有無發生不良反應。104.08.06
Agents for Diagnostic Use	Gadoxetate disodium (Primovist [®])、Gadopentetate Dimeglumine(Magnevist [®])、Gadodiamide (Omniscan [®])	醫學文獻指出，部分接受四次或更多次 GBCAs 磁振造影的病人，於最後一次用藥一段時間後，仍發現有 GBCAs 蓄積於腦部之情形。目前尚未知這些 gadolinium 蓄積物是否對人體有害或有不良反應，此仍有待更多的資訊評估其安全性。104.08.11
Metabolic & Nutrient Agents	Febuxostat(Feburic [®])	我國全國藥物不良反應通報中心接獲數件疑似使用含 febuxostat 成分藥品後發生嚴重皮膚不良反應，如：SJS 或 DRESS，其中包含 1 件死亡通報個案。104.10.30

冬令談補-人參與黃耆於補氣方面的運用

吳明德藥師

中醫之「氣」者，主要是指人體各器官的「生理機能」。所謂「氣虛」，是指各器官的生理機能「不足」的狀態，尤其是指消化器官（脾）與呼吸器官（肺）的生理機能不足。以中醫學的觀點而言，氣與血具有極密切的關係，藉著氣的作用，可生成血液，並使其運行，因此，補氣藥又用於「血虛」；又氣為血帥，氣行則血行、氣滯則血凝，配合活血祛瘀藥以增強行血「散瘀」的作用。

人參，始載於《本經》，為五加科多年生植物 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的乾燥根，性味甘、微苦、微溫，歸脾入肺經；主產於中國的吉林、遼寧、黑龍江，以及朝鮮半島、東西伯利亞等地。黃耆，始載《本經》，又稱黃芪《綱目》，豆科(Leguminosae)，多年生草本植物蒙古黃耆 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜莢黃耆 *A. membranaceus* (Fisch.) Bge. 的乾燥根。蒙古黃耆主產於內蒙古、吉林、山西、河北等地。膜莢黃耆主產於山西、黑龍江、甘肅、內蒙古等地。

人參與黃耆皆具有「補氣」的功效，但兩者的藥理作用仍有其差異。人參於「補氣」方面的功能在於「大補元氣、復脈固脫」，大多「生用」於「氣虛欲脫」的重症，例如體虛欲絕、心力衰竭、原发性休克等症。黃耆於「補氣」方面的功能在於「益衛固表」或「益氣固表」，採「灸用」補中益氣，運用於易疲勞、脈搏軟緩時，可服用黃耆，但是須長期間多量服用方能發生效果。人參可補五臟的氣，故適用於裏虛。黃耆可補肌表的氣，故適用於表虛。倘若同時使用人參和黃耆的話，可以全面增強補益力。

人參與黃耆雖屬補益佳品，但不可將「中藥當成膳補」，就過度濫用。根據研究指出，成人每日使用超過 0.3 克人參根末，連續服用六個月，可致失眠、抑鬱、頭痛、心悸、血壓升高、性機能減退、體重減輕等情況。體質壯實者，服人參過量也常感覺閉氣、胸悶、腹脹。經常服用人參一個月以上，可能發生人參濫用綜合證。藥物在使用上有其使用時間的限制(a limited duration)與規則基礎(on a regular basis)，因此，人參與黃耆於「補氣」上的運用應依個人體質而定，並以「大補元氣或益衛固表」為「辨證後選擇」的考量，勿同一而言，以免「傷其形、失其性、喪其功」。

在此，仍不忘提醒用藥民眾，食品與藥品是不同的。「食品」(food)係指可以提供身體的營養物(nutritional support)，經消化後由細胞轉成能量以「維持」生命者，例如脂肪、蛋白質、維生素或礦物質。而「藥品」(medicine 或 medication)係指可用來處理、治療、預防、診斷疾病或有助於生理或心理的健康(well-being)的生物活性的成分。換句話說，每一個藥物在低劑量至高劑量所產生的生物活性與副作用之間存有線性關係；這也意謂每一個藥物的使用都有其作用期間的限制(a limited duration)與藥用的規則(on a regular basis)；在不同條件時有著藥物選擇性，生物活性的強弱並不能成為藥物的唯一選項，研究並「清楚知道」其副作用或毒性的「安全範圍」，才是藥師可為民眾用藥安全把關的依據。

參考文獻：

1. 漢方臨床應用全集（下），培琳出版社，發行人 何淑滿。中華民國 81 年 6 月。
2. 高等中醫研究參考書 14，知音出版社，主編顏正華，中藥學（下）。
3. 中藥炮製學。張賢哲、蔡貴花編著。國立編譯館主編中國醫藥學院協編。
4. 楊倉良，毒藥本草（2004），中國中醫藥出版社。

10410-10411 藥物諮詢分享

Q: 院內鐵劑 La Ferrum 停用了，是否有其他替代品項？可以直接取代嗎？

A: 目前有二價鐵劑 Foliromin (Ferrous Sodium Citrate)，規格為 50 mg/tab，常用劑量為 1 顆 BID。而先前的 La Ferrum (Ferric Salts (Iron (III) hydroxide Polymaltose Complex))是三價鐵劑，規格為 100 mg/tab。因為三價鐵會轉換為二價鐵而吸收，所以依建議劑量可以取代使用。

Q: 本院是否有健保給付之人工淚液？

A: 本院人工淚液共有兩種，Liquifilm Tears 為瓶裝人工淚液，健保有給付。另一為自費之人工淚液 Tears Naturele，不含防腐劑，故開瓶 12 小時後需丟棄不可繼續使用，劑型為單支包裝，每盒 32 支。

Q: 請問院內有哪些 HMG-CoA reductase inhibitors ？

A: 本院 HMG-CoA reductase inhibitors 品項有 5 種。其中 4 種為單方，分別為：Atorva (Atorvastatin) 40 mg/tab、Lipitor(Atorvastatin) 20 mg/tab、Livalo(Pitavastatin) 2 mg/tab、Crestor (Rosuvastatin) 10 mg/tab。而複方為 Vytorin (Ezetimibe & Simvastatin) 20 & 10 mg/tab。

Q: 器官移植病人想施打成人公費流感疫苗，醫師詢問今年疫苗是活性減毒疫苗還是不活性疫苗？

A: 依據 104 年流感疫苗施打計畫書描述，我國的流感疫苗皆為不活性，所以效果較弱，需每年施打。

Q: 因為病人有英文藥袋的需求，診間護理師詢問英文藥袋是由醫師開立，還是藥局可列印？

A: 兩者皆可。一般藥袋列印預設為中文，如果病人領藥後發現是中文，但想要更改為英文，藥局可協助列印英文藥袋。診間也可以直接開立英文藥袋，民眾來領藥時就會是英文藥袋了。

診間開立英文藥袋方法：開藥畫面下方勾選「列印英文藥袋」並確認。

