

肝膿瘍

何謂肝膿瘍：

肝膿瘍是肝臟的一種感染症，也是腹腔內最常發生膿瘍的器官。因細菌或阿米巴造成肝組織發炎壞死，形成局部膿液聚集現象，會引起敗血症，嚴重時會死亡。

肝膿瘍之原因：

- 1.膽道結石、狹窄或癌症所引發的膽道感染，或是因為臨近組織感染，如橫膈膜下膿瘍、急性膽囊炎等而散佈至肝臟。
- 2.經由血液將其他器官的感染源帶至肝臟，而造成肝膿瘍，如經由肝門靜脈將闌尾炎、憩室炎、發炎性大腸炎、腸胃穿孔等感染細菌散播感染，或是經由肝動脈將肺炎、心內膜炎、急性中耳炎及其它原因引起的菌血症散播到肝臟。

那些人容易發生肝膿瘍：

人體的免疫系統會自動對抗細菌，所以細菌想吃到肝臟通常不太容易。因此，通常體弱、營養不良、免疫力差的人(如老年人、慢性酒精中毒、糖尿病、愛滋病、肝硬化、腎衰竭及使用免疫抑制劑者)由於白血球功能降低，減低吞噬外來細菌的能力，才容易引起細菌感染。

症狀：

- 1.全身倦怠及噁心、嘔吐
- 2.右上腹疼痛及食慾減退
- 3.畏寒、發冷、發燒不退
- 4.肝臟腫大及壓痛感

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 護理部

診斷方式：

由腹部超音波、電腦斷層及磁振攝影檢查可發現肝內膿瘍，由細針抽取和細菌培養證實。

治療方法：

1. 抗生素治療。
2. 放置引流管將膿液引流出。
3. 抗生素及膿液引流效果不佳時，則考慮手術治療。

引流管照顧注意事項：

1. 引流管要放低，不可高過插管之傷口，以免引流液回流造成感染。
2. 保持導管的通暢，避免壓折到或打結。
3. 將引流管固定好避免拉扯到管子，造成引流管位置改變。
4. 引流管剛放置時，引流液會略帶紅色血液是正常現象，但若引流液一直有紅色血液且量多，請告知護理人員。
5. 洗澡時避免浸濕傷口，若不慎弄濕傷口請告知護理人員，予重新傷口換藥避免感染。

日常生活注意事項：

1. 食物並無特別禁忌，可採均衡飲食，以增加體抗力。
2. 若引流管之傷口有紅、腫、熱、痛或膽汁溢出及膿性分泌物的情形，請立即返院檢查。

敬祝您 身體健康 平安吉祥

佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院諮詢專線 02-66289779 轉 8252