

## 治療

關於蜂窩組織炎的治療目前以  
抗生素為主，首先必須做血液培養  
(Blood Culture)及敏感試驗(Sensitivity  
Test)，再依結果選用適當的抗生素。  
常用的抗生素為第一代頭孢子素及  
Oxacillin，通常七至十天即可痊癒。  
但若已形成膿瘍，就必須由外科醫  
師做切開引流及清創的處理。

## 防治

1. 應隨時保持個人良好衛生習慣。
2. 感染之傷口，不論有多微小，都  
需注意是否有傷口感染現象發生  
生。

## 蜂窩性組織炎



敬祝您 身體健康 平安吉祥

諮詢專線 02-66289779 轉 2562

E8R2822631-F2

淺黃道林70P 21×29.7cm(寶)

兒科團隊關心您

一種皮膚傷口的細菌感染(常見的細菌包括鏈球菌、葡萄球菌、大腸菌、嗜肉菌等)。細菌經由傷口侵入真皮和皮下組織釋放毒素，在組織空隙內滋長，引起局部組織炎性反應。

人體的皮下脂肪層是一區區像蜂窩狀的組織，所以如果這個區域發炎腫大，就稱之為『蜂窩性組織炎』。

### 發生的部位

最常侵犯臉部、頸部及腳部等部位，並可經淋巴系統侵犯到周邊結締組織。

### 初期特徵

1. **紅**：皮膚表面及傷口周圍紅腫潮紅，界限不是很清楚。
2. **腫**：受傷部位表面輕微隆起。
3. **熱**：被感染之區域較其他正常區域溫度稍高。
4. **痛**：患處受牽連區域會持續疼痛或有化膿現象。
5. **淋巴管炎或局部淋巴腺腫**：病灶近側方向常見鮮紅色輕度浮腫、疼痛、線狀或帶狀的淋巴管炎，而腫大的淋巴腺其上皮呈浮腫潮紅。

### 罹患蜂窩性組織炎的高危險群：

1. **免疫功能差者**：包括糖尿病病人、痛風病人、老年人、肝功能受損、免疫力較差或使用免疫抑制劑者、嬰幼兒、營養不良等。
2. **有開放性傷口**：如外傷、拔智齒、香港腳等。外傷是造成細菌入侵的主要原因，持續的復發或是出現紅、腫、熱、痛等症狀時，就必須要特別小心，有異狀一定要就醫，有時表面的癒合並不能代表內部細菌已被徹底瓦解。