


6. 若小朋友要更換衣服或洗澡時
可請護理人員協助。
7. 注射部位若接近關節時請勿用力
彎曲關節。
8. 點滴瓶與輸液管路如脫落，請勿
自行將點滴管路插回點滴瓶內，
以免感染。
9. 若點滴不順、注射處紅腫、點滴
瓶滴至點滴卡紅線處、抗生素滴
至10cc請立即告知護理人員前往
處理。

敬祝您 身體健康 平安吉祥
諮詢專線 02-66289779 轉 2562

E8R2822630-F2

淺黃道林70P 21×29.7cm(寶)

小兒靜脈點滴注射須知



兒科團隊關心您

親愛的家長：

由於您的孩子生病了，經醫生診斷評估後，需注射大量點滴，為了減少在住院期間重新注射的機會，以下幾點注意事項提供參考。

需要注射點滴的原因

當孩子生病，如嘔吐、腹瀉，經醫師評估後需注射大量點滴，來補充水分及基本的營養，或需由點滴中注射小量的藥物，就必須建立輸液管路。

點滴注射的流程

孩子因血管細小，且因為害怕哭鬧難固定，常需要較多時間才能找到適當的血管。為了讓注射過程順利，減少孩子對病床的恐懼，護理人員會將孩子帶到治療室注射點滴。當您聽到孩子哭聲時會很心疼，當然醫護人員心情也跟您一樣，因此我們希望家長能陪伴在旁協助安撫，或是在治療室外等候，待注射完成後會協助您帶孩子回病房。

輸注點滴之注意事項

1. 請勿用力拉扯管路避免管路掉落，以減少不必要的感染。
2. 避免將點滴低於孩童注射處，以避免血液回流。
3. 請勿將孩童抱過高於點滴，如要抱高請將點滴架調高。
4. 勿讓孩子站立於床上，以避免輸液不順暢。
5. 切勿亂調點滴滴數以免影響藥效或造成傷害。