


## 磨粉替代方法


★ 非所有藥品都可以用此方法給藥，請提前詢問藥師。

### ■ 磨粉替代方法的步驟

1. 請準備好要給予的藥品、水杯、筷子(攪拌用)和常溫飲用水。
2. 將所有藥品放入水杯中，加入 20 毫升常溫飲用水，如果藥品大於 6 種或有粉劑時，則稍微增加水量。



3. 靜置 5 至 10 分鐘。
4. 利用筷子均勻混合，形成懸浮液即可給藥。



5. 再次加入 20 毫升常溫飲用水於水杯中，用於沖洗杯壁後喝下。  
若有鼻胃管的病人，需將藥液倒入灌食空針後，再加入 20 毫升常溫飲用水於水杯中，沖洗水杯。



6. 然後再次倒入灌食空針流入鼻胃管，用於沖洗管壁。



### ■ 注意事項

1. 勿將藥品提前泡製成藥液，因長時間浸泡藥品在水杯中，可能會影響藥品的藥效，故給藥前才準備。
2. 服藥時使用的相關器具應每日清潔。

2

3. 藥品的使用方式請依藥袋上指示，若對於藥品是否可以磨粉或泡水有疑問時，請諮詢藥師。
4. 如果您有飲水量限制，請提前諮詢醫師或藥師。
5. 服藥時應搭配常溫飲用水，不可將藥品加至食物、茶、果汁、營養補充品等飲品混合服藥。
6. 如果您對此方法有任何疑問，請隨時聯繫藥師。

### ■ 磨粉替代方法的優點

1. 避免藥品磨粉後吸濕潮解
2. 降低藥品劑量損失
3. 無交叉汙染
4. 降低投藥人員藥品粉塵暴露
5. 對於使用鼻胃管的病人，可以降低鼻胃管堵塞風險
6. 給藥程序簡單，可在短時間內泡製

### ■ 備註

磨粉替代方法參考日本學者 Kurata 設計之簡易懸濁法，將藥錠整顆放於常溫飲用水中，等待藥錠崩解懸浮後給藥，為

3

一種不粉碎藥錠以泡水崩解懸浮藥品的方法。可提供有磨粉需求或使用鼻胃管的病人多一種選擇。

守護健康、守護生命、守護愛



病人用藥指導卡

## 磨粉替代方法

靜思小語：

與人廣結善緣，不但可以莊嚴身相，還能讓人一見即起歡喜心。

各院區藥品諮詢電話：

台北(02) 6628-9779 轉 2150

花蓮(03) 856-1825 轉 3345

大林(05) 264-8000 轉 5384

潭子(04) 3606-0666 轉 1133

服務地點：門診藥局藥物諮詢窗口

諮詢電話：(02)6628-9779 轉

8915(日)、8918(日)、2155(24 小時)

台北慈濟醫院藥學部 關心您



佛教慈濟  
醫療財團法人 台北慈濟醫院  
Taipei Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation