

## 10904-10905 新增、停用品項

## 新增品項

藥名	衛福部核准適應症
Famoster 10mg/mL, 2mL/amp (Famotidine)	住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性(難治的)十二指腸潰瘍，或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法。
FluCOnazole 2 mg/mL, 100mL/bot (Flucon)	抗黴菌劑。
Hemoclot 10% 500mg/5 mL/amp (Tranexamic Acid)	全身及局部出血或出血性疾病
INVEGA Sustenna 150mg/1.5mL/syringe(Paliperidone)	治療思覺失調症。分裂情感障礙症之急性治療的單一治療藥物或作為情緒穩定劑及(或)抗憂鬱劑的輔助用藥。
Amanda/100mg/tab/Amantadine	巴金森病，預防及治療 A 型流行性感感冒症狀
Broen-C (Bromelain 20000units & L-Cysteine 20mg)	手術後及外傷後腫脹之緩解、副鼻腔炎、乳房鬱積、呼吸器疾患隨伴喀痰喀出困難、氣管內麻醉後之喀痰喀出困難、痔核。
Cirzodone 50mg/tab (Trazodone)	治療各種型態之抑鬱症
Detrusitol 2mg/tab (Tolterodine))	治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。
Hydroquine 200mg/tab (Hydroxychloroquine)	圓盤狀及全身性紅斑狼瘡、慢性多形日光疹、慢性風濕性關節炎、鎌狀瘧原蟲和間日瘧原蟲引起之瘧疾。
Isomil 40 mg/tab (Verapamil)	狹心症
Xofluza 20mg/tab (Baloxavir marboxil)	XOFLUZA 適用於治療成人及12歲以上兒童之A型及B型流行性感感冒病毒急性感染。
Fluticasone Cream 0.05% 5g/tube (Fluticasone)	緩解皮膚病之發炎以及搔癢症狀，如：溼疹、包括異位性、初期和盤狀溼疹；結節性癢疹；乾癬(不包括廣泛性板塊之乾癬)；神經性皮膚炎，包括單純苔癬；扁平苔癬、脂漏性皮膚炎、接觸性過敏反應、圓盤狀紅斑性狼瘡、一般性紅皮症全身性類固醇治療之輔助治療、螫刺症、汗疹(痱子)。
Trelegy Ellipta 30dose/bot (Fluticasone 92mcg, Umeclidinium 55mcg, Vilanterol 22mcg/dose)	Trelegy Ellipta 是一種吸入性的皮質類固醇/抗膽鹼激性藥物/長效型 b2 腎上腺素作用劑複方製劑，適用於已接受吸入性皮質類固醇 與長效 β2 作用劑合併治療，或已定期使用兩種吸入型長效支氣管擴張劑合 併治療，而仍控制不佳的慢性阻塞性肺病(COPD)患者，以治療氣道阻塞。

Trelegy Ellipta 也適用於降低有惡化病史患者之 COPD 惡化。

## 停用品項

藥名	衛福部核准適應症
Detrusitol SR 4mg/prolonged-release cap (Tolterodine)	治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症
DEXT-SALINE Injection 2.5%:0.45%, 500mL/bag	手術及其他疾患之水份、電解質及營養的補給
Dostinex 0.5mg/tab (Cabergoline)	防止及抑制產後乳汁分泌，或治療高泌乳素血症引起的狀況
Enzil 100 mg/tab (Amantadine)	巴金森病，預防及治療 A 型流行性感冒症狀
FluCOnazole 2 mg/mL, 100mL/bot	抗黴菌劑。
Isoptin SR 240 mg/tab (Verapamil)	高血壓
Lysozyme 90mg/tab	慢性副鼻腔炎、呼吸器疾患所伴隨之膿痰喀出困難、手術中、後之出血(齒科、泌尿科領域)
Mesyrel 50 mg/tab (Trazodone)	治療各種型態之抑鬱症。
Plaquenil (Hydroxychloroquine) 200 mg/tab	圓盤狀及全身性紅斑性狼瘡、慢性多形日光疹、慢性風濕性關節炎、鎌狀瘧原蟲和間日瘧原蟲引起之瘧疾。
Risperdal Consta 25 mg/vial (Risperidone)	治療急性及慢性精神分裂症之精神病及其他有明顯活性症狀(如幻覺、妄想、思考障礙、敵意、多疑)和/或負性症狀(如情感遲滯、情緒和社交退縮、缺乏言談)的精神異常狀況。RISPERDAL CONSTA 亦可減輕伴隨精神分裂症產生之情感症(如抑鬱、愧疚感、焦慮)。RISPERDAL CONSTA 可合併鋰鹽及 VALPROATE 以預防快速循環型雙極性疾患 (RAPID CYCLING BIPOLAR DISORDER) 之復發。 Risperdal Consta 可單獨使用作為非快速循環型之第一型雙極性疾患病患的維持治療，以預防狂躁或混合型復發。
Strattera (Atomoxetine HCL) 25mg/cap	注意力缺損/過動症 (ADHD)
Vidisic Gel 10 gm/tube (Carbomer)	乾眼症
Seretide 50evohaler ,120 metered actuations/bt	可逆性呼吸道阻塞疾病 (ROAD) SERETIDE 適用於可逆性呼吸道阻塞疾病 (ROAD) 之常規治療，包括適合使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之患有氣喘的兒童與成人。 這可能包括：

正在使用長效乙型作用劑( $\beta$ -agonist)及吸入型皮質類固醇之有效維持劑量的患者。

正在接受吸入型皮質類固醇療法，而仍有症狀之患者。

接受支氣管擴張劑之常規治療，而需要吸入型皮質類固醇之患者。

(公費)75歲以上老人 Pneumovax 23  
25mcg/0.5ml/vial

預防肺炎鏈球菌性肺炎及肺炎鏈球菌性菌血症。