



眼底鏡視網膜檢查

1.

向新陳代謝科醫師或糖尿病衛教室269診
索取『糖尿病眼科轉診單(黃單)』

2.

掛眼科門診及持『黃單』前往眼科報到

3.

檢查眼壓及視力。

視網膜檢查：

點散瞳藥水，需30分鐘等待瞳孔放大，
如果選擇不要散瞳則無須點散瞳眼藥水。

4.

眼底鏡攝影

5.

眼科醫師看診，批價：持『糖尿病眼科轉診單(黃單)』批
價，可減免當次眼科掛號費

	優點	缺點
散瞳	瞳孔放大 ，使眼底檢查 <u>更詳盡</u> ，以便更清楚檢查玻璃體、視網膜、黃斑部、視神經等。	1. 點散瞳劑約 <u>需等待</u> 30~60 分鐘，瞳孔才會完全放大(此時請於候診區靜候)。 2. 檢查後，藥效會持續 2-4 小時才會復原。可能會畏光、視力模糊、閱讀困難等症狀，當日 <u>不宜騎機車或自行開車</u> 或其他需依賴正常視力的活動。
非散瞳	1. 無行車危險顧慮。 2. 減少等待散瞳瞳孔放大時間。	<u>只能看到 2/3 的視網膜</u> ，無法看到全部的視網膜，有遺漏的可能。

請注意

無論做「散瞳」或「非散瞳」

的檢查，都須請您耐心等候看診

糖尿病衛教室關心您的健康 諮詢專線(02)6628-9779 分機 2269