

10902-10903 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛福部適應症
Juluca 50mg & 25mg (Dolutegravir & Rilpivirine)	適用於符合以下所有情況的人類免疫不全病毒-1 (HIV-1)感染症成人病人，替代其現行全部抗反轉錄病毒處方治療：(1)現行抗反轉錄病毒處方治療劑量維持穩定且達到病毒學抑制效果 (HIV-1 RNA<50 copies/mL)持續至少六個月，(2)過去無治療失敗病史，(3)對本品的兩種抗反轉錄病毒藥物成分，皆無已知或疑似之抗藥性。
Dovato (Dolutegravir 50mg/Lamivudine 300mg)/tab	治療第一型人類免疫不全病毒(HIV-1)感染症的成人與 12 歲以上、體重至少 40 公斤青少年，且對二種抗反轉錄病毒藥物成分不具已知或疑似抗藥性的病人。
Beriplex P/N 500mg/vial (Protein C, Factor II, Factor VII, Factor IX, Factor X, Protein S Antigen)	1.治療及手術前後期間預防因後天性缺乏凝血酶原複合凝血因子，如因接受維生素 K 拮抗劑治療造成之缺乏或維生素 K 拮抗劑過量，且須快速校正缺乏量時之出血。 2.治療及手術前後期間預防因先天性缺乏任一種維生素 K 依賴型凝血因子的情況下，且無法供應純化之特定凝血因子濃縮製劑時之出血。
COVID-19 Vaccine 【AZ】 0.5mL/dose (Adenovirus DNA Vector)	用於 18 歲以上青少年及成人之主動免疫接種，以預防 2019 年冠狀病毒疾病(COVID-19，及本國法規所稱「嚴重特殊傳染性肺炎」)。
Delstrigo (Doravirine 100mg / Lamivudine 300mg / Tenofovir 300 mg)/tab	適用於治療下列感染第一型人類免疫缺乏病毒 (HIV-1)的成年病人： 1.未接受過抗反轉錄病毒療法。 2.正穩定接受抗反轉錄病毒療法、已達病毒學抑制狀態(HIV-1 RNA < 50 copies/mL)、未有治療失敗病史，且不具已知與 DELSTRIGO 中任一各別成分抗藥性相關的突變。
Hepac 25KU/5mL/vial (Heparin)	血栓性栓塞症及其預防、抗凝血。
Kingmin 4% 10mL/bt (Sulfamethoxazole)	結膜炎、流行性角膜炎、眼瞼炎、眼瞼緣炎、砂眼、淚腺炎。
Skyrizi 75mg/0.83mL/Pre-filled syringe (Risankizumab)	適合接受全身性治療的中度至重度斑塊性乾癬成人病人。

Smokfree 20.8 mg/patch (Nicotine)	幫助戒菸
Stesolid Rectal Tube 10mg/2.5mL/tube (Diazepam)	小孩熱痙攣、癲癇患者抽搐發作、牙科手術或輕微手術前或檢查前之鎮靜劑。
TOP EFFERVESCENT GRANULES	診斷用藥

停用品項

藥名	衛福部適應症
(新北市公費 65-74 歲老人) Pneumovax 23, 25mcg/0.5mL/vial (Pneumococcal Polysaccharide Vaccine)	預防肺炎鏈球菌性肺炎及肺炎鏈球菌性菌血症。
★Agglutex 25KU/5mL/vial (Heparin sodium)	血栓性栓塞症及其預防、抗凝血。
Budema 1 mg/tab (Bumetanide)	水腫、利尿。
Cyproh 4 mg/tab (Cyproheptadine)	過敏性疾患如皮膚炎、鼻炎、蕁麻疹、搔癢症、枯草熱、藥物過敏症。
E-Z-Gas II	診斷用藥
HyperRAB 150Unit/mL, 2mL/vial (Rabies immune globulin)	提供被動免疫以預防狂犬病感染。
METALCAPTASE 300 mg/tab (D-Penicillamine)	類風濕關節炎、重金屬中毒
Methylprednisolone 500 mg/vial	腎上腺皮質機能不全，劇烈休克、支氣管性氣喘、膠原疾病、過敏反應、泛發性感染。
Silkis Oint 3mcg/g, 30g/tube (Calcitriol)	小於 35%體表面積之輕度至中重度乾癬。
Sovaldi F.C 400mg/tab (Sofosbuvir)	<p>成人患者：SOVALDI 與其他藥物併用可以治療患有慢性 C 型肝炎病毒(HCV)感染症的成人患者。</p> <ul style="list-style-type: none"> 與 pegylated interferon 及 ribavirin 併用可治療未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型 1 或 4 感染症。 與 ribavirin 併用可治療未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型 2 或 3 感染症。 <p>兒童患者：SOVALDI 與 ribavirin 併用可治療 12 歲(含)以上或體重至少 35 公斤以上，且未併有肝硬化或併有代償性肝硬化之兒童患者的慢性 HCV 基因型 2 或 3 感染症。</p>
Tetracycline oph oint. 5g/tube	眼部細菌傳染性炎症。