

新增品項

| 藥品 | 衛福部適應症 |
|--|---|
| Antilon 60mg/tab (Pyridostigmine Bromide) | 重症肌無力 |
| Benlysta (Belimumab) 400mg/vial | <ol style="list-style-type: none"> 與標準治療併用，適用於在標準治療下仍存有高疾病活性(如：同時符合 anti-dsDNA 陽性、低補體、SELENA SLEDAI ≥ 8)的自體免疫抗體陽性的全身性紅斑性狼瘡 5 歲以上病人。 與標準治療併用，適用於患有活動性狼瘡腎炎的成年病人。 |
| Cortiment 9 mg/tab (Budesonide) | 用於誘發緩解成人輕至中度活動性潰瘍性結腸炎 |
| Glyxambi 25mg & 5mg/tab (Empagliflozin & Linagliptin) | <p>GLYXAMBI 錠劑適用於配合飲食控制及運動，以改善下列第二型糖尿病人者的血糖控制：使用 metformin 合併 empagliflozin 或 linagliptin 未能達到適當血糖控制者；或已在 empagliflozin 及 linagliptin 合併治療者。</p> <p>Empagliflozin 用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，可降低心血管原因死亡的風險。然而，本品糖順平用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，其降低心血管原因死亡的風險的有效性尚未被建立。</p> |
| Pamorelin 22.5mg/vial (Triptorelin embonate) | <ol style="list-style-type: none"> 用於晚期攝護腺癌之紓解治療(palliative treatment)。 用於治療中樞性性早熟(central precocious puberty, CPP)發病年齡在 2 歲(含)以上至 8 歲前(女孩)或 9 歲前(男孩)之兒童。 與放射療法併用且於放射療法結束後繼續投予，用於治療高風險局部或局部晚期攝護腺癌患者。 |
| Trulicity (Dulaglutide) 1.5mg/0.5mL/pen | <ol style="list-style-type: none"> 第二型糖尿病。 用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病或多項心血管風險因子的成年病人，可降低重大不良心血管事件的風險。 |
| Vosevi (Sofosbuvir 400mg & Velpatasvir 100mg & Voxilaprevir 100mg / tab) | <p>衛福部適應症 未併有肝硬化或併有代償性肝硬化(Child-Pugh A 級)的成人慢性 C 型肝炎病毒(HCV)感染症，並且符合以下任一條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 基因型 1、2、3、4、5 或 6,且曾經接受含 NS5A 抑制劑之 HCV 療程。 基因型 1a 或 3，且曾經接受含 sofosbuvir 但無 |

停用品項

| 藥品 | 衛福部適應症 |
|---|--|
| 3TC 150mg/tab (Lamivudine) | 與其他抗反轉錄病毒劑合併使用、治療成人及兒童之人體免疫缺乏病毒(HIV)感染。 |
| DUODART 0.5mg/0.4mg capsules (Dutasteride & tamsulosin hydrochloride) | 有症狀且攝護腺增大之攝護腺肥大症的第二線治療。 |
| Humalog 100 IU/ml, 3 mL/支 (Insulin lispro) | 糖尿病。 |
| Levemir FlexPen 100 IU/mL, 3mL (Insulin Detemir) | 糖尿病：治療患有糖尿病的成人、青少年及 1 歲以上兒童。 |
| Mestinon 60 mg/tab (Pyridostigmine Bromide) | 重症肌無力。 |
| Olumiant 4 mg/tab (Baricitinib) | <ol style="list-style-type: none"> 類風溼性關節炎：合併 methotrexate 或其他傳統型疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs)，用於治療患有中度到重度活動性類風濕性關節炎且對至少一種疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs) 無法產生適當治療反應或無法耐受之成人病人；在這些病人中，若病人無法耐受或不適合繼續投與 methotrexate 或其他傳統型疾病緩解型抗風濕藥物 (DMARDs)，可給予 Olumiant 單獨治療。 異位性皮膚炎：治療適合接受全身性治療的中度至重度異位性皮膚炎之成人病人。 |
| Pamorelin 11.25mg/vial (Triptorelin embonate) | <ol style="list-style-type: none"> 用於晚期攝護腺癌之紓解治療 (palliative treatment)。 與放射療法併用且於放射療法結束後繼續投予，用於治療高風險局部或局部晚期攝護腺癌患者。 |