

Paxlovid 禁忌、已確定及其他潛在重要的藥物交互作用

禁忌合併使用藥物

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
abemaciclib	捷癌寧	抗癌藥	可能導致抗癌藥濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，故不建議併用。 如無法避免併用，應考慮降低抗癌藥的劑量，並建議監測不良反應 (如：血液學毒性、腫瘤溶解症候群[噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、充血性心衰竭、心律不整、痙攣等])。
alfuzosin	列優治	攝護腺用藥	可能導致 alfuzosin 濃度上升，發生嚴重低血壓，故禁止併用。
amiodarone	臍得樂	抗心律不整藥	可能導致抗心律不整藥物的濃度上升，發生心跳徐緩、QT 間期延長等不良反應；如有併用抗心律不整藥物，應謹慎並建議監測不良反應。
apalutamide	安列康	抗癌藥	可能導致 Paxlovid 血中濃度不足，導致治療效果不佳，出現抗藥性，治療期間不要併用此藥品，待完成 Paxlovid 5 天療程後，再開始用藥。
atorvastatin	立普妥 立舒脂 妥寧 脂脈優 (複方) 優泰脂 (複方)	降膽固醇用藥	可能導致他汀類(Statin 類) 藥物濃度上升，發生嚴重不良反應 (如：肌肉病變 [包括橫紋肌溶解]、關節痛、肝功能異常等)，禁止併用。 如無法避免併用，必要時須調整降血脂藥的劑量或延長給藥時間。
bedaquiline	貝達喹啉	肺結核用藥	可能導致 bedaquiline 濃度上升，發生 QT 間期延長等不良反應；如有併用，應謹慎並建議監測不良反應。
bosentan	喘可利 全可利	心血管用藥	可能導致 bosentan 濃度上升，出現頭痛、血紅素下降、肝指數上升等不良反應，故禁止併用。

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
			如無法避免併用，請在 Paxlovid 治療前 36 小時停用 bosentan，治療期間亦不要服用，完成 Paxlovid 療程後 10 天，再開始用藥。
carbamazepine	癲通	癲癇用藥	可能會讓 Paxlovid 血中濃度不足，導致治療效果不佳，出現抗藥性，治療期間不要併用此藥品，待完成 Paxlovid 5 天療程後，再開始用藥。
ceritinib	立克癌	抗癌藥	可能導致抗癌藥濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，故不建議併用。 如無法避免併用，應考慮降低抗癌藥的劑量，並建議監測不良反應 (如：血液學毒性、腫瘤溶解症候群[噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、充血性心衰竭、心律不整、痙攣等])。
clarithromycin	克羅利黴素 開羅理黴素	抗生素	可能導致 clarithromycin 濃度上升，發生嚴重和/或危及生命的反應，故禁止併用。 如無法避免併用，應謹慎並建議監測不良反應 (如：QT 間期延長、心室心律失常等)。
clozapine	來特平 克慮平	抗精神病藥	可能導致抗精神病藥物濃度上升，發生嚴重和/或危及生命的反應 (如：焦慮感上升、頭暈、低血壓現象)，禁止併用。
colchicine	秋水仙鹼片 可樂喜定	痛風用藥	可能導致秋水仙濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，特別是肝、腎功能不全病人，故禁止併用。 如無法避免併用，應謹慎並建議監測不良反應 (如：腹瀉、血球減少等)。
cyclosporine	新體睦 生體睦	免疫抑制劑	可能導致免疫抑制劑濃度上升，建議應監測不良反應 (如：頭痛、高血壓等)，並對免疫抑制劑進行治療血中濃度監測。

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
			如果不能密切監測免疫抑制劑血中濃度，應避免併用。如無法避免併用，必要時須調整免疫抑制劑劑量或延長給藥時間。
dasatinib	柏萊	抗癌藥	可能導致抗癌藥濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，故不建議併用。如無法避免併用，應考慮降低抗癌藥的劑量，並建議監測不良反應 (如：血液學毒性、腫瘤溶解症候群[噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、充血性心衰竭、心律不整、痙攣等])。
digoxin	毛地黃 隆我心 地高新	心血管用藥	可能導致 digoxin 濃度上升，發生不良反應；如無法避免併用，應謹慎將 digoxin 劑量減少約 30-50%或減少給藥頻率，並密切監測藥物血中濃度。
dihydroergotamine	塞戈羅	偏頭痛用藥	可能導致偏頭痛用藥濃度上升，發生急性麥角毒性的潛在可能性，如：四肢和其他組織 (包括中樞神經系統) 血管痙攣和缺血，故禁止併用。
dronedarone	脈泰克	抗心律不整藥	可能導致抗心律不整藥物的濃度上升，發生心跳徐緩、QT 間期延長等不良反應；如有併用抗心律不整藥物，應謹慎並建議監測不良反應。
ergotamine	痛安錠 (複方) 易克痛 (複方)	偏頭痛用藥	可能導致麥角類藥物濃度上升，發生急性麥角毒性的潛在可能性，如：四肢和其他組織 (包括中樞神經系統) 血管痙攣和缺血，故禁止併用。
ethinyl estradiol	黛麗安 溫不妊 28	荷爾蒙避孕藥	可能導致荷爾蒙避孕藥血中濃度不足，建議 Paxlovid 治療期間，應使用有效的非荷爾蒙避孕措施；完成 Paxlovid 療程後 28 天，再開始使用荷爾蒙避孕藥。
felodipine	菲可平 普心寧	心血管用藥	可能導致 felodipine 濃度上升，發生不良反應；如無法避免併用，建議從最低

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
			劑量開始給予，並建議監測不良反應 (如：低血壓、水腫等)。
fentanyl	吩坦尼 多瑞喜穿皮貼片 平舒疼口頰溶片 歐必德穿皮貼片劑	麻醉鎮痛藥	可能導致 fentanyl 濃度上升，發生極度鎮靜和呼吸抑制的可能性，故禁止併用。如無法避免併用 fentanyl，應考慮降低 fentanyl 的劑量，並密切監測。
flecainide	律博克	抗心律不整藥	可能導致抗心律不整藥物的濃度上升，發生心跳徐緩、QT 間期延長等不良反應；如有併用抗心律不整藥物，應謹慎並建議監測不良反應。
ibrutinib	億珂	抗癌藥	可能導致抗癌藥濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，故不建議併用。如無法避免併用，應考慮降低抗癌藥的劑量，並建議監測不良反應 (如：血液學毒性、腫瘤溶解症候群[噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、充血性心衰竭、心律不整、痙攣等])。
isavuconazonium	驅黴霸	抗黴菌藥	可能導致抗黴菌藥物濃度上升，發生嚴重或危及生命的不良反應，特別是肝功能不全病人，故禁止併用。
itraconazole	適撲諾 易克黴	抗黴菌藥	可能導致抗黴菌藥物濃度上升，發生不良反應，特別是肝功能不全病人，故不建議併用。如無法避免併用，itraconazole 每日限制劑量不可超過 200 毫克。
ketoconazole	永克黴 酮康唑	抗黴菌藥	可能導致抗黴菌藥物濃度上升，發生不良反應，特別是肝功能不全病人，故不建議併用。如無法避免併用，itraconazole 每日限制劑量不可超過 200 毫克。
lercanidipine	利壓	心血管用藥	可能導致 lercanidipine 濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應 (如：低血壓、心跳徐緩)，故禁止併用。

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
lovastatin	樂脂清	降膽固醇用藥	可能導致他汀類(Statin 類) 藥物濃度上升，發生嚴重不良反應 (如：肌肉病變 [包括橫紋肌溶解]、關節痛、肝功能異常等)，禁止併用。 如無法避免併用，請在 Paxlovid 治療前 12 小時停用他汀類藥物，治療期間亦不要服用，待完成 Paxlovid 療程後，再開始用藥。
lurasidone	樂途達	抗精神病藥	可能導致抗精神病藥物濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應 (如：焦慮感上升、頭暈、低血壓現象)，禁止併用。
methysergide	美脫琴	偏頭痛用藥	可能導致偏頭痛用藥濃度上升，發生急性麥角毒性的潛在可能性，如：四肢和其他組織 (包括中樞神經系統) 血管痙攣和缺血，故禁止併用。
midazolam (口服)	導眠靜 導美睡	鎮定/安眠藥	可能導致藥物濃度上升，發生極度鎮靜和呼吸抑制的可能性，故禁止併用。 如無法避免併用 midazolam，應考慮降低 midazolam 的劑量，並密切監測。
neratinib	賀儷安	抗癌藥	可能導致抗癌藥濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，故不建議併用。 如無法避免併用，應考慮降低抗癌藥的劑量，並建議監測不良反應 (如：血液學毒性、腫瘤溶解症候群[噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、充血性心衰竭、心律不整、痙攣等])。
nifedipine	冠脈循 冠達悅 心得利 壓達能	心血管用藥	可能導致 nifedipine 濃度上升，發生不良反應；如無法避免併用，建議從最低劑量開始給予，並建議監測不良反應 (如：低血壓、水腫等)。
nilotinib	泰息安	抗癌藥	可能導致抗癌藥濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，故不建議併用。 如無法避免併用，應考慮降低抗癌藥的

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
			劑量，並建議監測不良反應 (如：血液學毒性、腫瘤溶解症候群[噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、充血性心衰竭、心律不整、痙攣等])。
nimodipine	腦妥	心血管用藥	可能導致 nimodipine 濃度上升，發生嚴重和/或危及生命的反應 (如：低血壓、心跳徐緩)，故禁止併用。
phenobarbital	苯巴比特魯 惠腦必達	癲癇用藥	可能會讓 Paxlovid 血中濃度不足，導致治療效果不佳，出現抗藥性，治療期間不要併用此藥品，待完成 Paxlovid 5 天療程後，再開始用藥。
phenytoin	癲能停 阿雷彼阿慶 苯乙內醯 (月尿)	癲癇用藥	可能會讓 Paxlovid 血中濃度不足，導致治療效果不佳，出現抗藥性，治療期間不要併用此藥品，待完成 Paxlovid 5 天療程後，再開始用藥。
propafenone	心利正	抗心律不整藥	可能導致抗心律不整藥物的濃度上升，發生心跳徐緩、QT 間期延長等不良反應；如有併用抗心律不整藥物，應謹慎並建議監測不良反應。
pimozide	杜鬱錠	抗精神病藥	可能導致抗精神病藥物濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應 (如：焦慮感上升、頭暈、低血壓現象)，禁止併用。
piroxicam	伏加斯 必樂信	鎮痛藥	可能導致藥物濃度上升，發生消化道出血的可能性，故禁止併用。
quinidine	奎尼丁	抗心律不整藥	可能導致抗心律不整藥物的濃度上升，發生心跳徐緩、QT 間期延長等不良反應；如有併用抗心律不整藥物，應謹慎並建議監測不良反應。
quetiapine	思樂康 安保思 優達平	抗精神病藥	可能導致 quetiapine 濃度上升，發生不良反應，如無法避免併用，建議從最低劑量開始給予，並根據需要謹慎調高劑量。
ranolazine	諾瑞心寧	心血管用藥	可能導致 ranolazine 濃度上升，由於可

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
			能發生嚴重和/或危及生命的反應，禁止併用。
rifabutin	淨核	肺結核用藥	可能導致藥物濃度上升，發生不良反應，特別是肝功能不全病人，故禁止併用。如無法避免併用，應謹慎並建議監測是否出現血液學異常及虹彩炎。
rifampin	立汎黴素 立泛黴素 利肺膠囊 (複方) 樂肺寧 (複方) 衛肺特 (複方) 兒立服-2 (複方) 愛兒肺平-3 (複方) 立剋核-4 (複方) 祛核-四合(複方)	肺結核用藥	可能導致 Paxlovid 血中濃度不足，導致治療效果不佳，出現抗藥性，治療期間不要併用藥品，待完成 Paxlovid 5 天療程後，再開始用藥。
rivaroxaban	拜瑞妥	抗凝血劑	可能導致抗凝血劑濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，禁止併用。如無法避免併用，應謹慎並建議監測不良反應 (如：血便、血尿等出血症狀)。
simvastatin	素果	降膽固醇用藥	可能導致他汀類(Statin 類) 藥物濃度上升，發生嚴重不良反應 (如：肌肉病變 [包括橫紋肌溶解]、關節痛、肝功能異常等)，禁止併用。如無法避免併用，請在 Paxlovid 治療前 12 小時停用他汀類藥物，治療期間亦不要服用，待完成 Paxlovid 療程後，再開始用藥。
sirolimus	斥消靈	免疫抑制劑	可能導致免疫抑制劑濃度上升，建議應監測不良反應 (如：頭痛、高血壓等)，並對免疫抑制劑進行治療血中濃度監測。如果不能密切監測免疫抑制劑血中濃度，應避免併用。如無法避免併用，必要

藥品學名	常見中文商品名	藥品類別	可能的影響
			時須調整免疫抑制劑劑量或延長給藥時間。
sildenafil (治療肺動脈高壓)	瑞肺得	PDE5 抑制劑	可能導致 sildenafil 濃度上升，發生嚴重和/或危及生命的反應 (如：視覺異常、低血壓、勃起時間延長和暈厥)，禁止併用。 如無法避免併用，應謹慎並建議監測不良反應 (如：頭痛、低血壓、消化不良等)。
triazolam	酣樂欣	鎮定/安眠藥	可能導致藥物濃度上升，發生極度鎮靜和呼吸抑制的可能性，故禁止併用。
trazodone	美舒鬱 杏緩妥	抗憂鬱劑	可能導致抗憂鬱劑濃度上升，發生嚴重不良反應 (如：噁心、頭暈、低血壓和暈厥)，故禁止併用。 如無法避免併用，應考慮降低抗憂鬱劑的劑量。
venetoclax	唯可來	抗癌藥	可能導致抗癌藥濃度上升，發生嚴重或危及生命的反應，故不建議併用。 如無法避免併用，應考慮降低抗癌藥的劑量，並建議監測不良反應 (如：血液學毒性、腫瘤溶解症候群[噁心、嘔吐、昏睡、水腫、體液過多、充血性心衰竭、心律不整、痙攣等])。
voriconazole	徽飛	抗黴菌藥	可能導致抗黴菌藥物濃度上升，發生不良反應，特別是肝功能不全病人，故不建議併用。

本單張無法列出所有關於 Paxlovid 交互作用的詳細資訊，當您仍有疑問時，敬請撥打我們的諮詢電話(02)6628-9779 轉 2150 與我們聯繫，感謝您。