

11108-11109 新增、停用品項

新增品項

| 藥名 | 衛福部核准適應症 |
|---|--|
| ★ Alfentanil Injection 0.5mg/ml, 2ml/amp (Alfentanil) | 短效麻醉性止痛劑及麻醉誘導劑。 |
| ★ Urokinase 60 KU/vial | 急性肺栓塞、急性冠狀動脈栓塞、清潔靜脈導管、末梢動脈靜脈栓塞症。 |
| ★ Xarelto F.C 2.5mg/tab (Rivaroxaban) | 與乙醯水楊酸(ASA)併用，可用於發生缺血事件高危險群之冠狀動脈疾病(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人，以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件(atherothrombotic events)。 |
| Elidel Cream 1% 10mg/gm, 15gm/tube (Pimecrolimus) | 第二線使用於 3 個月以上兒童、青少年及成人異位性皮膚炎之短期及間歇性長期治療。 |
| Medason 40mg/vial (Methylprednisolone) | 腎上腺機能不全、劇烈休克、支氣管性氣喘、膠原疾病、過敏反應、泛發性感染 |
| Mycocep 250mg/cap (Mycophenolate mofetil) | 與 Cyclosporin 和類固醇併用，預防或緩解腎臟移植之急性器官排斥、預防心臟和肝臟移植之急性器官排斥。與皮質類固醇合併使用，用於在患有 International Society of Nephrology /Renal Pathology Society (ISN/RPS) 第 III、第 IV 或第 V 類狼瘡性腎炎(lupus nephritis)的成人病人中作為前導及維持治療。 |
| Nicorette chewing gum 2mg/tab (Nicotine) | 戒菸輔助劑 |
| Nicorette Chewing Gum 4mg/tab (Nicotine) | 戒菸輔助劑 |
| Rinvoq 15mg/tab (Upadacitinib) | <ol style="list-style-type: none"> 類風濕性關節炎：治療患有中至重度活動性類風濕性關節炎且對至少一種疾病緩解型抗風濕藥物(DMARDs)無法產生適當治療反應或無法耐受之成人病人。可用於單一療法或與 methotrexate 合併使用。 乾癬性關節炎：治療患有活動性乾癬性關節炎且對至少一種疾病緩解型抗風濕藥物(DMARDs)無法產生適當治療反應或無法耐受的成人病人。RINVOQ 可用於單一療法或與非生物製劑疾病緩解型抗風濕藥物(non- |

| | |
|--|---|
| | <p>biologic DMARDs)合併使用。</p> <p>3. 僵直性脊椎炎：治療曾對非類固醇抗發炎藥物(NSAID)反應不佳或耐受性不良的活動性僵直性脊椎炎成人病人。</p> <p>4. 異位性皮膚炎：治療患有中度至重度異位性皮膚炎，適合全身性療法的成人及 12 歲(含)以上青少年。</p> |
| Soonmelt 625mg/tab (Amoxicillin 500mg & Clavulanic acid 125mg) | 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。 |
| Trimbow 100/6/12.5 mcg/dose (Beclometasone, Formoterol, Glycopyrronium) | <p>1. 慢性阻塞性肺病(COPD)：用於重度以上呼氣氣流受阻 (FEV1 少於預測值之 50%) 及有惡化病史之慢性阻塞性肺病(COPD)成年病人，在已使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2 致效劑合併療法或長效 beta 2 致效劑與長效毒蕈結抗劑合併療法仍未得到充分治療時，作為維持治療使用，以控制症狀及降低反覆惡化發生。</p> <p>2. 氣喘：適用於已使用長效 beta 2 致效劑與中等劑量吸入型皮質類固醇維持合併療法仍未得到充分控制，且前一年內有一次以上氣喘發作的成年病人，作為氣喘的維持治療。</p> |

停用品項

| 藥名 | 衛福部核准適應症 |
|---|---|
| ★ Trulicity 1.5mg/0.5ml/pen (Dulaglutide) 暫時缺藥 | <p>1. 第二型糖尿病。</p> <p>2. 用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病或多項心血管風險因子的成年病人，可降低重大不良心血管事件的風險。</p> |
| Actemra 200mg/10mL/vial (Tocilizumab) | <p>1. 類風濕性關節炎(RA) Actemra 合併 methotrexate (MTX)用於治療成年人中度至重度類風濕性關節炎，曾使用一種或一種以上之 DMARD 藥物治療或腫瘤壞死因子拮抗劑(TNF antagonist)治療而反應不佳或無法耐受的病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Actemra 單獨治療。當 Actemra 與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度，此外，經 HAQ-DI 量表評估，可改善生理功能。</p> <p>2. 類風濕性關節炎(RA)–未曾使用 MTX 治療的 RA：Actemra 合併 methotrexate (MTX) 適用於治療先前未曾使用 MTX 治療的重度、活動性、進行性類風濕性關節炎成人病人。在這些病人中，若病人對 MTX 無法耐受或不適合繼續投與 MTX，可給予 Actemra 單獨治療。當 Actemra 與 MTX 合併使用時，經 X 光量測，可減緩關節傷害惡化速度。</p> <p>3. 多關節性幼年型原發性關節炎(PJIA)：Actemra 與 methotrexate (MTX)併用，適用於治療 2 歲(含)以上的活動性多關節性幼年型原發性關節炎，且對 MTX 治療反應不佳者。對於無法耐受或不適合繼續 MTX 治療的病人，可單獨使用 Actemra。</p> <p>4. 全身性幼年型原發性關節炎(SJIA)：Actemra 適用於治療 2 歲(含)以上的活動性全身性幼年型原發性關節炎病人，且對 NSAID 及類固醇治療反應不佳或無法耐受者。</p> |
| Cetrotide 0.25mg/vial (Cetrorelix acetate) | 預防接受卵巢強效刺激排卵治療的患者，早發性的排出不成熟的卵。 |
| Curam 625mg/tab (Amoxicillin 500mg & Clavulanic acid 125mg) | 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。 |
| Harvoni F.C. 90mg & 400mg/tab (Ledipasvir & Sofosbuvir) | 適用於治療慢性 C 型肝炎病毒(HCV)基因型 1、2、4、5 或 6 感染症成人患者。 適用於治療 12 歲(含)以上，且未併有肝硬化或併有代償性肝硬化的基因型 1 慢性 C 型肝炎感染症之兒童患者。 |
| Sinclote 400mg/cap (Disodium clodronate) | 惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移，惡性高血鈣症。 |
| Sortuss cough liquid 60mL/bot (Dextromethorphan HBr & Glyceryl Guaiacolate & Ipecac Fluid Extract) | 鎮咳、祛痰。 |

| | |
|--|---|
| <p>Symbicort Turbuhaler 120dose/bt (Budesonide & Formoterol)</p> | <ol style="list-style-type: none">1. 氣喘 (Asthma)適用於適合使用類固醇及長效β2作用劑 (β2-agonist) 合併治療的氣喘，以達到氣喘整體控制，包括預防、緩解症狀及降低惡化風險。2. 慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)適用於 18 歲以上患有慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)，使用氣管擴張劑後之第一秒吐氣量 (post-bronchodilator FEV1)少於預測值之 70%，及已定期使用支氣管擴張劑而仍有惡化病史的病人之治療。 |
| <p>Tacroli Ointment 10gm/tube (Tacrolimus)</p> | <p>第二線使用於 2 歲以上孩童、青少年及成人因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療的中度至重度異位性皮膚炎患者，作為短期及間歇性長期治療。</p> |