

## 2023.02-2023.03 新增、停用品項

### 新增品項

藥名	衛福部適應症
★ Jardiance 10mg/tab (Empagliflozin)	<ol style="list-style-type: none"> <li>第二型糖尿病： <ol style="list-style-type: none"> <li>血糖控制：第二型糖尿病。</li> <li>預防心血管事件：用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，可降低心血管原因死亡的風險。</li> </ol> </li> <li>心臟衰竭：JARDIANCE 用於紐約心臟學會 (NYHA) 第二級至第四級的心臟衰竭成人病人，可： <ol style="list-style-type: none"> <li>降低心血管死亡和心臟衰竭住院風險。</li> <li>減緩預估腎絲球過濾率(eGFR)下降。</li> </ol> </li> </ol>
★ Rocuronium Kabi 100mg/10mL (rocuronium bromide)	全身麻醉的輔佐藥，以幫助支氣管內插管、提供手術需快速麻醉誘導時骨骼肌肉鬆弛狀態，加護病房中需插管及使用人工呼吸器時。
★ Ryzodeg FlexTouch (70u/ml Insulin Degludec +30 u/ml Insulin Aspart) 300IU/3ml/syringe	用於治療一歲以上糖尿病患者，以改善血糖控制
Anol Injection 200mg/ml, 100ml/bag (Mannitol)	利尿、降顱內壓、腦水腫、促進毒物之尿中排除、腎小球過濾速率之測定（診斷用）
Atropine sulfate 1mg/mL/amp	膽石症、幽門痙攣、胃酸過多、胃痙攣、有機磷化物、毛果芸香鹼中毒、診斷用散瞳、調節痙攣、乙醚等麻醉時之抑制支氣管分泌。
Bisadyl supp 10mg/pill (Bisacodyl)	暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸。
Const-K Extended-Release Tablets 750mg/10mEq/tab(Potassium Chloride)	血鉀過低症（因手術前後、使用藥物、瀉肚、心臟病引起之血鉀過低症）。
Lumicef Subcutaneous Injection 210mg/syringe (Brodalumab)	<ol style="list-style-type: none"> <li>治療適合接受全身性治療的中至重度斑塊性乾癬成人病人。</li> <li>治療適合接受全身性治療的膿疱性乾癬之成人病人。</li> <li>治療對疾病緩解型抗風濕性藥物(DMARDs)無效或無法耐受的活動性乾癬性關節炎成人病人。</li> <li>治療患有活動性僵直性脊椎炎的成人病人。</li> </ol>

藥名	衛福部適應症
(專案) MgO 250mg/tab(Magnesium Oxide)	軟便。
Moxifloxacin Kabi 400mg/250mL/bag	用於治療成人(18 歲以上)感受性細菌引起的感染症，包括：上呼吸道及下呼吸道感染(急性鼻竇炎、慢性支氣管的急性惡化、社區性肺炎)，皮膚和軟組織的感染，複雜腹腔內感染(包括多種細菌感染症)。
Rich 30mg/cap (Lansoprazole)	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流性疾病-糜爛性逆流性食道炎之治療、胃食道逆流性疾病之症狀治療、Zollomger-Ellison 症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)相關的消化性潰瘍、治療因 NSAID 類藥物引起之胃潰瘍。
Sefore 400mg/200mL/bag (Ciprofloxacin)	<p>成人：</p> <p>對 ciprofloxacin 有感受性細菌所引起之呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染(包括淋病)、腹部感染(包括腸炎、膽囊炎、腹膜炎)、皮膚及軟組織感染、骨髓炎、關節感染、菌血症。</p> <p>小孩：</p> <p>大腸桿菌(Escherichia coli)引起之複雜性泌尿道感染和腎盂腎炎(1-17 歲) 一綠膿桿菌(P. aeruginosa)有關之囊腫性纖維化產生急性肺部惡化的現象(5-17 歲)</p> <p>成人和小孩：</p> <p>吸入性炭疽病(接觸後)</p>
TRUSOPT 2%, 5ml/bot (Dorzolamide)	高眼壓症、廣角性青光眼。
Skyrizi 150mg/mL/Pre-filled pen (Risankizumab)	<ol style="list-style-type: none"> <li>乾癬：適合接受全身性治療的中度至重度斑塊性乾癬成人病人。</li> <li>乾癬性關節炎：單獨使用或與傳統疾病緩解型抗風濕藥物(cDMARD)合併使用，適用於治療對疾病緩解型抗風濕藥物(DMARDs)療效不佳或無法耐受之活動性乾癬性關節炎成人病人。</li> <li>適用於治療 16 歲以上之中度至重度克隆氏症：對傳統治療或生物製劑治療反應不佳、失去反應、無法耐受、或不適合接受上述治療之病人。</li> </ol>

## 停用品項

### 廠商缺貨

藥名	衛福部適應症
AZOPT 1% 10mg/mL, 5mL/bot (Brinzolamide)	高眼壓症及隅角開放性青光眼之患者。
Bisacodyl supp 10mg/pill	暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸。
Ciproxin 400mg/200mL/bot (Ciprofloxacin)	成人： 對 CIPROFLOXACIN 有感受性之細菌所引起之呼吸道感染、中耳炎、竇炎、眼感染、腎臟及泌尿道感染（包括淋病）、腹部感染（包括腸炎、膽囊炎、腹膜炎）、皮膚及軟組織感染、骨髓炎、關節感染、菌血症。小孩：大腸桿菌引起之複雜性泌尿道感染和腎盂腎炎(1-17 歲)、綠膿桿菌有關之囊腫性纖維化產生急性肺部惡化的現象(5-17 歲)。  成人和小孩： 吸入性炭疽病(接觸後)。
Lyo-povigent inj 4mg/vial (Vitamins, Multiple)	不能或不能充分經口、經腸道補給營養而需依賴靜脈營養時之維他命補給。
MANNITOL 20% 500 mL/bot (Mannitol)	利尿、降顱內壓、腦水腫、促進毒物之尿中排除、腎小球過濾速率之測定（診斷用）
MgO 250mg/tab(Magnesium Oxide)	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多；軟便。
Takepron 30mg/tab (Lansoprazole)	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流性疾病-糜爛性逆流性食道炎之治療，胃食道逆流性疾病之症狀治療。Zollomger-Ellison 症候群、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)相關的消化性潰瘍、治療因 NSAID 類藥物引起之胃潰瘍。

### 藥品停用

藥名	衛福部適應症
★Jardiance 25mg/tab (Empagliflozin)	1.血糖控制：第二型糖尿病。 2.預防心血管事件：用於具第二型糖尿病且已有 心血管疾病的成人病人時，JARDIANCE 可降 低心血管原因死亡的風險。

★Novomix 30 Flexpen 100U/mL,  
3mL/prefilled pen (30% insulin aspart and  
70% insulin aspart protamine)

糖尿病。

Complera 200mg & 25mg & 300mg/tab  
(Emtricitabine & Rilpivirine & Tenofovir DF)

由兩種核苷類似物反轉錄酶抑制劑 (NRTIs) (emtricitabine/tenofovir DF) 及一種非核苷反轉錄酶抑制劑 (NNRTI) (rilpivirine) 組成之複方療法，適用於先前未曾使用過抗病毒藥物治療之愛滋病毒 (HIV-1) 感染之完整治療，且在治療開始時其病毒量 HIV-1 RNA  $\leq$  100,000 copies/mL 之 12 歲 (含) 以上且體重至少 35 公斤的患者；適用於特定正穩定接受抗反轉錄病毒療法，且治療開始時已達病毒學抑制狀態 (HIV-1 RNA  $<$  50 copies/mL) 的患者，取代其現有的抗反轉錄病毒療法。

Stelara 45mg/0.5mL/syringe (Ustekinumab)

#### (一) 乾癬 (Ps)

1. 適用於治療適合接受光療法或全身性治療的中至重度斑塊性乾癬成人病人 (18 歲 (含) 以上)。
2. 兒童乾癬 (Pediatric Psoriasis): 適用於治療對光療法或其他全身性治療無法有效控制或無法耐受之中至重度斑塊性乾癬兒童及青少年病人 (6 歲 (含) 以上)。

#### (二) 乾癬性關節炎 (PsA)

1. 適用於治療對疾病緩解型抗風濕性藥物 (DMARDs) 療效不佳之成人 (18 歲及以上) 活動性乾癬性關節炎。可單獨使用，亦可與 methotrexate (MTX) 併用。
2. 可單獨使用，亦可與 methotrexate (MTX) 併用，可以減緩疾病造成的關節結構性受損。

#### (三) 克隆氏症 (Crohn's Disease)

[誘導治療請使用喜達諾®靜脈注射液 130 毫克/26 毫升] 適用於治療下列中至重度活動性克隆氏症成人病人：

- ◆ 曾經使用免疫調節劑或皮質類固醇治療失敗或無法耐受這些藥物之作用，且曾接受抗 TNF  $\alpha$  藥物治療但並未失敗之病人。
- ◆ 曾經使用免疫調節劑或皮質類固醇治療失敗或無法耐受這些藥物之作用，且未曾使用過抗 TNF  $\alpha$  藥物之病人。
- ◆ 曾經使用一種 (含) 以上之抗 TNF  $\alpha$  藥物治療失敗或無法耐受這類藥物之作用的病人

(四) 潰瘍性結腸炎 (Ulcerative colitis)

適用於治療中至重度活動性潰瘍性結腸炎成人病人，且對傳統治療(如：皮質類固醇、6-mercaptopurine 或 azathioprine)或 其它生物製劑(如：腫瘤壞死因子[TNF]阻斷劑或 vedolizumab)治療無效、或對上述療法不耐受或有醫療禁忌者。

**原缺貨品項恢復供貨**

藥名	衛福部適應症
Antifect injection 1gm/vial (Cefepime)	對 Cefepime 具感受性之細菌感染症。