

## 11208-11209 新增、停用品項

### 新增品項

藥名	衛福部核准適應症
自費 Havrix (Hepatitis A Vaccine,inactivated ) 1440U / 1ml /syringe	A 型肝炎之主動免疫。
Beovu 120mg/mL, 0.165mL/syringe (Brolucizumab)	1.治療血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變(Neovascular (Wet)) Age-Related Macular Degeneration, wAMD)。 2.糖尿病黃斑部水腫(Diabetic macular oedema, DME)所導致的視力損害。
Colasa Enema 4gm/100mL/bot (Mesalazine)	潰瘍性結腸炎、輕度到中度之直腸炎及直腸乙狀結腸炎。
Folsmycin 4000mg/vial (Fosfomycin)	綠膿菌、變形菌、沙雷氏菌、葡萄球菌、大腸桿菌等具有感受性細菌所引起之下列感染症 (敗血症、支氣管炎、細支氣管炎、支氣管擴張症、肺炎、肺化膿症、膿胸、腹膜炎、腎盂腎炎、膀胱炎)。
Hydroxocobalamin 1mg/mL/amp (Hydroxocobalamin)	惡性貧血、大肉芽性及大血球性貧血、妊娠貧血、產褥貧血、胃腸性及營養性貧血、神經性貧血症狀
Lidocaine 1%, 20mg/2mL/amp	局部麻醉。
Methylone 4mg/tab (Methylprednisolone)	風濕性熱、風濕樣關節炎及過敏性症狀。
Nakasser SR 120mg/cap (Diltiazem)	高血壓。
Taigexyn 500mg/250ml/bag (Nemonoxacin)	治療成人對 Nemonoxacin 有感受性的致病菌所引起之感染：適合於門診治療之輕度社區性肺炎。
TAITA NO.2 Injection 500mL/bag (Electrolyte Solution)	高張性下痢及小兒下痢之水份、電解質、養份補充。

藥名	衛福部核准適應症
Trokendi XR 50mg/cap (Topiramate)	<ol style="list-style-type: none"> <li>用於成人及六歲以上兒童局部癲癇、併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇或 原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療。</li> <li>用於成人及六歲以上兒童局部癲癇 (PARTIAL ONSET SEIZURE) 之單一藥物治療。</li> <li>用於 12 歲以上患者之預防性偏頭痛。</li> </ol>

## 停用品項

- 廠商缺貨

藥名	衛福部核准適應症
B-Red 1mg/mL/amp (Hydroxocobalamin)	惡性貧血、巨赤芽球性貧血、寄生蟲性貧血、營養性大紅血球性貧血、妊娠性貧血、具有神經合併症之惡性貧血、維他命 B 1 2 缺乏症
Lupro 5mg/mL, 0.4mL/ syringe (Leuprolide Acetate)	前列腺癌舒解治療。
Etomidate-Lipuro 2mg/mL, 10mL/amp (Etomidate)	靜脈注射麻醉劑。
Requip 0.25mg/tab (Ropinirole)	<ol style="list-style-type: none"> <li>治療自發性帕金森氏症 ( IDIOPATHIC PARKINSON'S DISEASE)</li> <li>治療原發性腳部躁動症 (PRIMARY RESTLESS LEGS SYNDROME)</li> </ol>
UFO 4gm/Vial (Fosfomycin)	綠膿菌、變形菌、沙雷氏菌、葡萄球菌、大腸桿菌等具有感受性細菌所引起之下列感染症 (敗血症、支氣管炎、細支氣管炎、支氣管擴張症、肺炎、肺化膿症、膿胸、腹膜炎、腎盂腎炎、膀胱炎)。
Fespixon cream 15g/tube	糖尿病足部傷口潰瘍
Xylocaine 1%, 5mL/amp (Lidocaine HCl)	局部麻醉。

● 廠商停產

藥名	衛福部核准適應症
Metisone 4 mg/tab (Methylprednisolone)	風濕性熱、風濕樣關節炎及過敏性症狀。
Rifinah 150,100mg/tab (Rifampicin, Isoniazid)	結核病。
Cardizem Retard 90mg/tab (Diltiazem)	狹心症、高血壓。
【BA.4/BA.5 Moderna】 COVID-19 Vaccine 0.5mL/dose (mRNA vaccines)	18 歲以上預防 COVID-19 之追加接種。

● 院內停用

藥名	衛福部核准適應症
Cosentyx 150mg/mL/pre-filled pen (Secukinumab)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 斑塊性乾癬：治療適合接受全身性治療的中至重度斑塊性乾癬成人患者。</li> <li>2. 乾癬性關節炎：治療患有活動性乾癬性關節炎的成人病人。可單獨使用或與 methotrexate 併用。</li> <li>3. 僵直性脊椎炎：治療活動性僵直性脊椎炎成人病患。</li> </ol>
Topamax F.C 100mg/tab (Topiramate)	用於成人及兩歲以上兒童局部癲癇或併有 LENNOX-GASTAUT 症候群之癲癇及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療，用於 PARTIAL ONSET SEIZURE 病患之單一藥物治療、預防偏頭痛。
ANDROCUR 50 mg/tab (Cyproterone acetate)	<p>男性：嚴重性慾過強、抗雄性素治療前列腺腫瘤。</p> <p>女性：嚴重的男性化徵狀、青春痘、多毛症。</p>
Colasa Enema 2gm/100mL/bot (Mesalazine)	潰瘍性結腸炎、輕度到中度之直腸炎及直腸乙狀結腸炎。
Isentress F.C 400mg/tab (Raltegravir)	與抗反轉錄病毒藥物併用，適用於愛滋病毒 HIV-1 感染患者。

<p>★Gazyva 1000mg/40mL/vial (Obinutuzumab)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 慢性淋巴球性白血病 與 chlorambucil 併用，適用於先前未曾接受過治療，且具有合併症 (comorbidities)而不適合接受含 fludarabine 治療的 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病(CLL)患者。</li> <li>2. 濾泡性淋巴瘤 與化療藥物併用作為誘導治療，並續以 Gazyva 單藥維持治療，適用於先前未曾接受過治療的濾泡性淋巴瘤(FL)患者。 與 bendamustine 併用並續以 Gazyva 單藥維持治療，適用於先前曾接受含 rituximab 治療無效或復發的濾泡性淋巴瘤(FL)患者。</li> </ol>
<p>Cervarix 0.5mL/Syringe (Human Papillomavirus Vaccine Type 16/18)</p>	<p>Cearix 為一適合 9-25 歲女性施打之疫苗，可用以預防致癌性人類乳突病毒(HPV)第 16 型、第 18 型所引起之病變：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.子宮頸癌。 2.第 2 級與第 3 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN)和子宮頸原位腺癌(AIS)。 3.第 1 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN)。 4.第 1 級外陰上皮內贅瘤及第 1 級陰道上皮內贅瘤(VIN/VaIN)。</li> </ol> <p>Cervarix 亦可用於 26 歲以上女性預防致癌性人類乳突病毒(HPV)第 16 型、第 18 型所引起之第 1 級子宮頸上皮內贅瘤(CIN)。</p>

● 原缺貨品項恢復供貨，暫代品停用

藥名	衛福部核准適應症
<p>Proparacaine oph sol'n 5mg/ml, 15ml/bot (Proparacaine)</p>	<p>用於需要快速及短時間之眼科用表面麻醉劑。</p>
<p>★Ozempic 4mg/3ml/pen (Semaglutide)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。</li> <li>2. 用於已有心血管疾病的第二型糖尿病病人</li> </ol>

	<p>時，可降低發生主要心血管事件(MACE：包括心血管疾病死亡、非致命性心肌梗塞、非致命性中風)之風險。</p>
Monteka chewable tablets 4mg (Montelukast)	<p>適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。用於先前已接受過其他抗過敏藥品，但療效不佳或無法耐受之成人及小兒的日間及夜間的過敏性鼻炎(Allergic Rhinitis)。</p>
Linetero 600mg/tab (Linezolid)	<p>治療由下列感受性菌株感染的患者：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Vancomycin 抗藥性的 <i>Enterococcus faecium</i> 感染，包括併發菌血症的病例。</li><li>(2) 醫院感染的肺炎，由 <i>Staphylococcus aureus</i> (對 methicillin 有感受性和對 methicillin 有抗藥性的菌株) 或 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (對 penicillin 有感受性的菌株)所引起。</li><li>(3) 複雜性皮膚和皮膚構造感染，包括糖尿病足感染，無併發骨髓炎，由 <i>Staphylococcus aureus</i> (對 methicillin 有感受性和對 methicillin 有抗藥性的菌株)、<i>Streptococcus pyogenes</i> 或 <i>Streptococcus agalactiae</i> 所引起。</li><li>(4) 非複雜性皮膚和皮膚構造感染，由 <i>Staphylococcus aureus</i> (僅限於對 methicillin 有感受性的菌株) 或 <i>Streptococcus pyogenes</i> 所引起。</li><li>(5) 社區感染的肺炎，由 <i>Streptococcus pneumoniae</i> (僅限於對 penicillin 有感受性的菌株)，包括併發菌血症的病例，或 <i>Staphylococcus aureus</i> (僅限於對 methicillin 有感受性的菌株) 所引起。</li></ol>