

11304-11305 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛署適應症
Acylo 400mg/tab (acyclovir)	帶狀疱疹病毒引起之感染、單純疱疹病毒引起之皮膚黏膜感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全病人之單純疱疹感染、復發性單純疱疹感染之抑制、水痘之感染。
Aminfec 250mg/2mL/vial (Amikacin Sulfate)	革蘭氏陽性菌及陰性菌(包括綠膿感菌)所引起的感染症。
Ateol F.C. 100mg/tab "Standard" (Atenolol)	高血壓、狹心症。
Augmentin 156mg/5mL, 100mL/bot (Amoxicillin 125mg & Clavulanic Acid 31.25mg/5mL)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引起之感染症。
Caricalm 175mg,350mg,32mg /tab (Carisoprodol,Acetaminophen,Caffeine)	頸肩腕症候群、肩關節周圍炎、變形性脊椎症之肌肉鬆弛劑
Zerbaxa 1.5g/vial (ceftolozane 1g, tazobactam 0.5g)	治療18歲(含)以上成人,患有對 ceftolozane 與 tazobactam 具感受性的致病菌所引起的以下感染症: (1) 複雜性腹內感染,需與 metronidazole 併用。 (2) 複雜性泌尿道感染,包括腎盂腎炎。 (3) 院內感染性肺炎,包括呼吸器相關肺炎。
Dupixent 300mg/2mL/syringe (Dupilumab)	(1) 異位性皮膚炎:可用於治療患有中度至重度異位性皮膚炎且對局部處方治療控制不佳或不適合使用該療法的成人病人及6個月以上的兒童病人。可併用或不併用局部皮質類固醇治療。 (2) 氣喘:可作為6歲(含)以上患有嗜酸性白血球表現型或口服皮質類固醇依賴型之中度至重度氣喘病人,在已接受中劑量或高劑量吸入性皮質類固醇(ICS)及第2種控制藥物(如,

LABA, LTRA, LAMA 或

methylxanthines) 治療，或單獨接受高劑量 ICS 治療，仍有氣喘控制不佳現象時的附加維持治療(add-on maintenance therapy)。

- (3) 慢性鼻竇炎合併鼻息肉：可作為患有慢性鼻竇炎合併鼻息肉(CRSwNP)之成人病人在鼻內皮質類固醇治療下仍控制不佳的附加維持治療(add-on maintenance therapy)。
- (4) 結節性癢疹：可用於需全身性治療的中至重度結節性癢疹(PN)成人病人。
- (5) 嗜伊紅性食道炎：可用於治療12歲以上且體重至少達40公斤之嗜伊紅性食道炎(EoE)病人。

與飲食控制及運動配合治療，藉以改善下列第 2 型糖尿病成人病人的血糖控制效果：

- (1) 已在合併使用 linagliptin 與 metformin 治療且受到良好控制效果的病人
- (2) 單獨使用 metformin 未能達到適當控制效果的病人
- (3) 與 sulphonylurea 併用（亦即三重合併療法），用於治療使用最高耐受劑量之 metformin 與 sulphonylurea 仍未能達到適當控制效果的病人。

★Trajenta DUO 2.5 & 850mg (Linagliptin & Metformin)

停用品項

● 藥品停產

藥名	衛署適應症
Permethrin 5% w/w Cream, 30g/tube	疥瘡用藥
Vitamin C 500mg/cap (Ascorbic Acid)	壞血病、齒齦出血、維他命 C 缺乏症。

● 藥品停用

藥名	衛署適應症
Econopred plus 1% 5mL/bot (Prednisolone)	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩毛樣體炎等過敏性疾患。
Genvoya 150 & 150 & 200 & 10mg/tab (Elvitegravir & Cobicistat & Emtricitabine & Tenofovir)	下列感染第一型人類免疫缺乏病毒(HIV-1)且不具已知與嵌入酶抑制劑類藥品、emtricitabine 或 tenofovir 抗藥性相關的突變的病人：(1) 12 歲(含)以上且體重至少 35 公斤的成年與青少年。(2) 6 歲以上、體重至少 25 公斤且因會發生毒性反應而不適合使用其他療法的兒童。
Nephoxil 500mg/cap (Ferric Citrate)	適用於控制接受血液透析治療的成年慢性腎病患者之高磷血症。
Strattera 60mg/cap (Atomoxetine)	注意力缺損/過動症(ADHD)。

● 藥品缺貨

藥名	衛署適應症
Acemycin 500mg/2mL/vial (Amikacin Sulfate)	對 Gentamicin 具耐藥性之綠膿菌、變形菌、鋸桿菌、大腸菌、克雷白氏桿菌、腸內桿菌、檸檬桿菌屬 (Citrobacter)等對於 Amikacin 具敏感性之細菌所引起之下列感染症：敗血症、支氣管擴張症之感染症、肺炎、肺化膿症、腹膜炎、腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎、創傷、熱傷及手術後之繼發性感染症。
Benlysta 400mg/vial (Belimumab)	(1) 與標準治療併用，適用於在標準治療下仍存
Budema 1 mg/tab (Bumetanide)	水腫、利尿。
★Ozempic 2mg/1.5ml/pen (Semaglutide)	1. 單一療法或與其他糖尿病治療藥物併用，治療控制不佳的第二型糖尿病成人病人，作為飲食及運動之外的輔助治療。 2. 用於已有心血管疾病的第二型糖尿病病人時，可降低發生主要心血

管事件(MACE：包括心血管疾病死亡、非致命性心肌梗塞、非致命性中風)之風險。

Urosin 100mg/tab (Atenolol)

高血壓、狹心症。

● 原缺貨品項恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛署適應症
Lysozyme 90mg/tab (Lysozyme)	慢性副鼻腔炎、吸吸器疾患所伴隨之膿痰咯出困難、手術中、後之出血（齒科、泌尿科領域）。