

## 11408-11409 新增、停用品項

### 新增品項

藥名	衛署適應症
Dayvigo 5mg/tab (Lemborexant)	失眠症。
Kerendia 20mg/tab (Finerenone)	用於患有第二型糖尿病(T2D)相關的慢性腎臟病(CKD)成人病人，可降低持續性腎絲球過濾率(eGFR)下降、末期腎病(ESKD)、心血管死亡、非致命性心肌梗塞以及因心衰竭住院的風險。
Ongentys Hard Capsules 50mg/cap (Opicapone)	表現藥效終期運動功能波動現象(end-of-dose motor fluctuations)，以左多巴/多巴脫羧基酶抑制劑(levodopa/DOPA decarboxylase inhibitors)無法達到穩定治療效果之巴金森氏症成人病人的輔助治療。
Orkedia 2mg/tab (Evocalcet)	治療罹患慢性腎臟病(CKD)且接受透析之成人病人的次發性副甲狀腺機能亢進。
Remifentanil powder 2mg/vial (Remifentanil HCl)	(1) 於成人全身麻醉之誘導時，作為止痛劑。 (2) 於成人全身麻醉之維持時，作為止痛劑。
Salmon Injection Bp Synthetic 50IU/ml/amp (Calcitonin)	高血鈣危象、骨骼的帕哲特氏病(僅適合對替代療法無效或不適合這類療法的病人，如腎功能嚴重受損者)。
inpharderm A.D.E.Cream 30g/tube (Vitamine A,D3,E)	皮膚粘膜乾燥症、皮膚角化症、皮膚炎、濕疹、尋常性痤瘡、外傷及火傷之肉芽新生促進

藥名	衛署適應症
Wegovy 1.34mg/ml 3ml/pen (Semaglutide)	<p>肥胖與過重之體重控制</p> <p>(1) 做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為成人且初始身體質量指數 (BMI) 為 <math>\geq 30 \text{ kg/m}^2</math> (肥胖)，或 <math>\geq 27 \text{ kg/m}^2</math> 至 <math>&lt; 30 \text{ kg/m}^2</math> (過重) 且至少患有一項體重相關共病，例如血糖異常 (糖尿病前期或第二型糖尿病)、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸中止或心血管疾病。</p> <p>(2) 做為低熱量飲食及增加體能活動之輔助療法，適用對象為 12 歲以上的青少年，合併肥胖以及體重超過 60 kg。以 2.4 mg 或最高耐受劑量治療 12 週後，若青少年病人的身體質量指數 (BMI) 並未下降至少 5%，應停止本品治療並重新評估病人狀況。</p> <p>(3) 用於具有心血管疾病且身體質量指數(BMI) <math>\geq 27 \text{ kg/m}^2</math> 的成人病人，降低發生重大心血管不良事件(心血管疾病死亡、非致命心肌梗塞、非致命中風)的風險。</p> <p>(4) 用於正常收縮分率之心臟衰竭(HFpEF)且 BMI <math>\geq 30 \text{ kg/m}^2</math> 的成人病人，改善心臟衰竭症狀與其有關的身體日常活動限制，並降低心臟衰竭住院的風險。</p>

## 停用品項

- 藥品停產

藥名	衛署適應症
FLUCASON oph. suspension 1mg/mL, 5ml/bot (Fluorometholone)	眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛樣體炎。

- 藥品停用

藥名	衛署適應症
Cinaca F.C. 25mg/tab (Cinacalcet)	治療透析患者的次發性副甲狀腺機能亢進。
Comtan 200mg/tab (Entacapone)	併用 Levodopa / Benserazide 或 Levodopa / Carbidopa 兩類藥品治療帕金森氏症病人。
Hypnomidate Injection 20mg/10ml/ amp (Etomidate)	靜脈注射麻醉劑。

Olimel N12E Emulsion 1000mL/BAG

適於成人及二歲以上孩童在無法或因有禁忌症而不適宜進食或使用口服腸道營養劑之靜脈營養。

Orencia 250mg/vial (Abatacept)

1. 成人類風濕性關節炎
2. 乾癬性關節炎
3. 幼年型慢性關節炎
4. 預防急性移植植物抗宿主疾病(aGVHD)

※節錄衛署適應症，詳細內容敬請參考藥典※

Saxenda 6mg/mL, 3mL/syringe (Liraglutide)

1. 用於體重控制，做為低熱量飲食及增加體能活動外之輔助療法，適用對象為成人病人且初始身體質量指數(BMI)為 $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ，或 $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ 至 $< 30 \text{ kg/m}^2$ ，且至少有一項體重相關共病，例如第二型糖尿病、高血壓或血脂異常。以每天3.0 mg 治療 12 週後，若病人初始體重並未減輕至少 5%，應停止善纖達治療。
2. 12 歲以上且有下列狀況的青少年病人用於體重控制，做為均衡飲食及增加體能活動外之輔助療法：肥胖症(根據國際分界點，身體質量指數(BMI)相當於成人 $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ )並且體重超過60kg。以每天 3.0 mg 或最高耐受劑量治療 12 週後，若病人的 BMI 或 BMI 標準分數並未下降至少 4%，應停止治療並重新評估病人狀況。

Sinpharderm Cream 30gm/tube (Urea)

去角質。

## ● 藥品缺貨

藥名	衛署適應症
Alcaine Oph soln 0.5%, 75mg/15mL/bt (Proparacaine)	適用於需要快速及短時間之眼科用表面麻醉劑
Alpraline 0.5mg/tab (Alprazolam)	焦慮狀態
Bestnem 500 & 500mg/vial (Imipenem & Cilastatin Sodium)	對 Imipenem 具有感受性之革蘭氏陰性菌、陽性 菌感染症
Concerta 36mg/tab (Methylphenidate)	治療 6 歲（含）以上及 65 歲（含）以下患有注 意力不足過動症之兒童、青少年及成人病患

- 原缺貨品項恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛署適應症
Alprazolam 0.5mg/tab (Alprazolam)	焦慮狀態。
Aminopoly-H 7.115W/V% 500 mL/bot (Amino Acid Mixture)	腸外營養補充劑。
Culin 500 & 500mg/vial (Imipenem & Cilastatin Sodium)	對 Imipenem 具有感受性之革蘭氏陰性菌、陽性菌感染症。
Flucon 200mg/100mL/bot (Fluconazole)	抗黴菌劑。
Toncus ER 36mg/tab (Methylphenidate)	治療注意力不足過動症。
Tranexamic Acid Injection 250mg/5mL/amp (Tranexamic Acid)	全身及局部出血或出血性疾病。
Winbest 2mg/mL, 5mL/amp (Cisatracurium besylate)	本品為一高選擇性及競爭性的非去極化神經肌肉阻斷劑。可作為手術全身麻醉劑之輔助劑或加護病房使用，用以鬆弛骨骼肌，幫助氣管插管及與人工呼吸器的協調。