

## 中心靜脈導管照護須知

### 一、目的

1. 測定右心房壓力及心臟接受及排出血液的能力。
2. 作為輸液及加藥治療或腸道外營養補給的管道。

### 二、我需要注意什麼？

1. 保持傷口乾燥、清潔。
2. 每日觀察有無紅、腫、熱、痛、及有無膿樣分泌物。
3. 洗澡時注意：注射部位敷料包覆範圍避免敷料滲濕，盡可能以擦澡方式。
4. 翻身、換尿布、下床或更換衣服時請小心，不要拉扯管路。
5. 若注射部位於頸部時，上衣建議穿前扣式衣服，避免穿脫時不慎拉扯管路；注射部位於鼠蹊部時，建議穿有鬆緊帶寬鬆的褲子。
6. 當您有感到管子留存部位有搔癢感，請告知護理師勿自行拔除管路。
7. 注射點滴時，請保持點滴瓶高於施打部位，以防回血管路阻塞，若點滴不滴時，請立即通知護理師處理。
8. 睡覺時勿壓迫導管，如放置於腹股溝時，則應減少彎曲大腿及下床活動，儘量避免90度的坐姿，以免導管回血阻塞、扭曲或滑脫。
9. 若病人意識障礙無法配合，經醫師評估給予約束，請家屬配合勿將約束帶鬆脫，護理人員會定時前來進行評估，預防病人自拔管路造成傷害。
10. 若發現管路已滑脫情形，請立即呼叫護理人員前往協助。

### 三、下列情形請告知護理人員協助處理

1. 注射部位敷料脫落或滲濕。
2. 注射部位出現傷口、水泡或入針處皮膚周圍紅腫熱痛。
3. 導管內有血漬沉積。
4. 注射帽脫落時。

諮詢專線 02-66289779 轉 (8351)

台北慈濟醫院關心您