

11412-11501 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛署適應症
Abrysvo 0.5ml/vial (RSV Subgroup A,B Prefusion F Antigen)	1. 母體在懷孕期間接種，提供出生至 6 個月大嬰兒被動免疫，以預防呼吸道融合病毒所引起之下呼吸道疾病。 2. 60 歲以上成人之主動免疫接種，以預防呼吸道融合病毒所引起的下呼吸道疾病。 3. 發生 RSV 疾病風險較高之 18 至 59 歲成人之主動免疫接種，以預防呼吸道融合病毒所引起之下呼吸道疾病。
Achefree 15mg/1.5ml/amp (Meloxicam)	用於類風濕性關節炎及骨關節炎之短期及急性之症狀治療
Bistin 20mg/tab (Bilastine)	緩解成人及 12 歲(含)以上兒童過敏性鼻炎(季節性和常年性)及慢性蕁麻疹的症狀。
Curam 1200mg/vial (Amoxicillin 1000mg, Clavulanic Acid 200mg)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
Curosurf 80mg/ml,1.5ml/vial (phospholipidic fraction from pig lung)	治療早產兒呼吸窘迫症候群。
Eylea 8mg/0.07ml/vial (Aflibercept)	血管新生型 (溼性) 年齡相關性黃斑部退化病變。糖尿病黃斑部水腫(DME)所導致的視力損害。
FETROJA 1gm/vial (cefiderocol sulfate tosylate)	適用於治療成人病人對 Fetroja®具有感受性之革蘭氏陰性微生物所引起的下列感染： 1. 複雜性泌尿道感染，包含腎盂腎炎。 2. 院內感染型肺炎和呼吸器相關肺炎。
Holdipine 10mg/10ml/amp (Nicardipine HCl)	適用於當口服治療不可行或不合適時、對高血壓的短期處置。
LOKELMA powder for oral suspension 5g/pk (sodium zirconium cyclosilicate)	適用於治療成人病人之高血鉀症。
Midatin 1mg/ml, 50ml/bot (midazolam)	知覺鎮靜、急救加護病房鎮靜、麻醉誘導及維持、手術前給藥。

藥名

衛署適應症

<p>Nilemdo 180mg/ tab (Bempedoic Acid)</p>	<p>原發性高膽固醇血症或混合型血脂異常 適用於患有異合子家族性和非家族性之原發性高膽固醇血症、或混合型血脂異常的成人病人，作為飲食的輔助治療以降低低密度脂蛋白膽固醇：</p> <ul style="list-style-type: none"> 與 statin 類藥品併用、或併用於 statin 合併其他降血脂療法，治療已接受最大耐受劑量 statin 仍無法達到低密度脂蛋白膽固醇目標值的病人，或， 單獨或與其他降血脂療法併用，治療無法耐受 statin 或禁用 statin 的病人。 <p>心血管疾病 適用於無法接受建議劑量 statin 治療(包含無法接受 statin 治療)，且患有動脈粥狀硬化心血管疾病或動脈粥狀硬化心血管疾病高風險的成人病人，藉由降低 LDL-C 的濃度以降低非致命性心肌梗塞及冠狀動脈血管重建風險，作為校正其他風險因子的輔助治療。</p>
<p>Nolbaxol 80mg/4mL/vial (Docetaxel)</p>	<p>乳癌、非小細胞肺癌、前列腺癌、胃腺癌、頭頸癌。</p>
<p>Paricalcitol 5 mcg/ml/amp(paricalcitol)</p>	<p>使用於伴隨慢性腎功能衰竭(慢性腎臟疾病第五期)的次發性副甲狀腺機能亢進的預防與治療。</p>
<p>Phyloxol 30mg 5mL vial (Paclitaxel)</p>	<p>晚期卵巢癌、腋下淋巴轉移之乳癌，作為接續含杜薩魯比辛 (DOXORUBICIN) 在內之輔助化學療法、已使用合併療法 (除非有禁忌，至少應包括使用 ANTHRACYCLINE 抗癌藥) 失敗的轉移乳癌、非小細胞肺癌、愛滋病相關卡波西氏肉瘤之第二線療法；與 CISPLATIN 併用，作為晚期卵巢癌之第一線療法。與 GEMCITABINE 併用，可使用於曾經使用過 ANTHRACYCLINE 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患、與 HERCEPTIN 併用時，用於治療未接受過化學治療之轉移性且乳癌過度表現 HER-2 之病人。</p>
<p>Phyloxol 90mg 15mL vial (Paclitaxel)</p>	<p>同上</p>
<p>Prevenar 20 0.5mL/ PFS (Pneumococcal 20-valent conjugate vaccine)(20vPnC)</p>	<p>沛兒肺炎鏈球菌二十價結合型疫苗適用於 6 週以上兒童、青少年和成人的主動免疫接種，以預防肺炎鏈球菌血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 及 33F 所引起的侵襲性疾病。</p>

藥名

衛署適應症

Rekambys 900mg/3ml/vial(Rilpivirine)

適用於與 cabotegravir 注射劑併用，治療在穩定抗反轉錄病毒療法下已達病毒學抑制效果(HIV-1 RNA< 50 copies/mL)、對 cabotegravir 及 rilpivirine 不具已知或疑似抗藥性之成人的人類免疫不全病毒第 1 型病毒感染症。

Rexulti 2mg/ tab (Brexpiprazole)

- 思覺失調症
- 阿茲海默症之失智症相關激動症狀。

使用限制：不適合作為視需要給予(PRN)方式治療阿茲海默症之失智症相關激動症狀

- 成人重鬱症的輔助治療。

Trelegy Ellipta 30dose/bot (Fluticasone 184mcg, Umeclidinium 55mcg, Vilanterol 22mcg/dose)

1. 慢性阻塞性肺病維持治療：適用於已接受吸入性皮質類固醇與長效 β_2 作用劑合併治療，或已定期使用兩種吸入型長效支氣管擴張劑合併治療，而仍控制不佳的慢性阻塞性肺病病人，以治療氣道阻塞。也適用於降低有惡化病史病人之 COPD 惡化。
2. 氣喘維持治療：適用於併用吸入性長效型 β_2 -腎上腺受體作用劑和吸入性皮質類固醇治療氣喘仍控制不佳的成年病人，做為氣喘維持治療。

Tulip F.C 20mg/tab (Atorvastatin)

高膽固醇血症，高三酸甘油脂血症。對於臨床上沒有冠心病的第二型糖尿病患者，但是至少有任一其他冠心病危險因子，包括高血壓、視網膜病變、白蛋白尿、或吸煙，適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險。降低冠心病高危險群的心血管事件發生率。對於臨床上沒有冠心病的高血壓患者，但是至少有三個其他冠心病危險因子，包括第二型糖尿病、年紀大於等於 55 歲、微白蛋白尿或蛋白尿、吸煙、或第一等親在 55 歲(男性)或 60 歲(女性)前曾經發生冠心病事件，適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險、降低血管再造術與心絞痛的風險。

Vocabria 600mg/3mL/vial (Cabotegravir)

與 rilpivirine 注射劑併用，治療已達病毒學抑制效果(HIV-1 RNA <50 copies/mL)且對 cabotegravir 及 rilpivirine 不具已知或疑似抗藥性之成人的 HIV-1 感染症。

停用品項

- 藥品停產

藥名	衛署適應症
Bufencon 7mg/mL/amp (Betamethasone Dipropionate & Betamethasone Phosphate Disodium)	肌肉骨骼與軟組織疾患、過敏性疾患、皮膚疾患、膠質病。
Mobic 15mg/1.5mL/amp (Meloxicam)	用於類風濕性關節炎及骨關節炎之短期及急性之症狀治療
Survanta 200mg/8mL Intratracheal suspension (Beractant)	預防和治療早產兒之呼吸窘迫症。

- 藥品停用

藥名	衛署適應症
Atotin 20mg/tab (Atorvastatin)	高膽固醇血症，高三酸甘油酯血症。對於臨床上沒有冠心病的第二型糖尿病患者，但是至少有任一其他冠心病危險因子，包括高血壓、視網膜病變、白蛋白尿、或吸煙，適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險。降低冠心病高危險群的心血管事件發生率。對於臨床上沒有冠心病的高血壓患者，但是至少有三個其他冠心病危險因子，包括第二型糖尿病、年紀大於等於 55 歲、微白蛋白尿或蛋白尿、吸煙、或第一等親在 55 歲(男性)或 60 歲(女性)前曾經發生冠心病事件，適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險、降低血管再造術與心絞痛的風險。
Azetin Nasal Spray 120dose/bot (Azelastine)	過敏性鼻炎。
Caltsue 2 mcg/mL/amp (Calcitriol)	處理長期腎透析病患的低血鈣情況。
Intaxel 30mg/5mL/vial (Paclitaxel)	晚期卵巢癌、液下淋巴轉移之乳癌，作為接續含 DOXORUBICIN 在內之輔助化學療法、已使用合併療法（除非有禁忌至少應包括使用 ANTHRACYCLINE）失敗的轉移乳癌、非小細胞肺癌、愛滋病相關卡波西氏肉瘤之第二線療法；與 CISPLATIN 併用作為晚期卵巢癌之第一線療法。與 GEMCITABINE 併用於曾經使用過 ANTHRACYCLINE 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌病患；與 HERCEPTIN 併用時用於治療

	未接受過化學治療之轉移性且乳癌過度表現 HER-2 之病人。
Prevenar 13 0.5mL/syringe (Pneumococcal Conjugate Vaccine (13-Valent))	可用於出生 2 個月至 17 歲嬰兒及兒童與青少年的主動免疫接種，以預防血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 及 23F 肺炎鏈球菌引起的侵入性疾病。也可用於預防 2 歲以下嬰幼兒血清型 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F 及 23F 肺炎鏈球菌引起的中耳炎。本疫苗可用於 18 歲(含)以上之成人與老年人的主動免疫接種，以預防血清型 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F 及 23F 肺炎鏈球菌引起的侵入性疾病和肺炎。
Recormon 5000 IU/ 0.3mL/支 (Epoetin beta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 治療慢性腎衰竭且伴隨症狀性貧血病人。 2. 治療與癌症化學治療有關的症狀性貧血。 3. 治療正在接受腫瘤治療之多發性骨髓瘤、低度非何杰金氏淋巴瘤或慢性淋巴性白血病成人患者的症狀性貧血。
Soonmelt 600mg/vial (Amoxicillin 500mg & Clavulanic Acid 100mg)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
Ultibro Breezhaler (Indacaterol 110mcg/Glycopyrronium 50mcg/cap)	慢性阻塞性肺疾 (包括慢性支氣管炎及肺氣腫) 之維持治療。降低有惡化病史病人之 COPD 惡化。

● 藥品缺貨

藥名	衛署適應症
(自費) Moderna LP.8.1 0.5mL/Syringe (Spikevax)	適用於 6 個月以上兒童、青少年及成人之主動免疫接種，以預防新型冠狀病毒疾病 (COVID-19)。
Lixiana 60 mg F.C. Tablets (Edoxaban)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預防非瓣膜性心房纖維顫動合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞。危險因子包括：鬱血性心臟衰竭、高血壓、年齡\geq75 歲、糖尿病、先前曾發生中風或暫時性腦缺血。 2. 在初始 5 到 10 日的非經腸道抗凝血藥物治療後，可用於治療靜脈栓塞。靜脈栓塞包括深層靜脈栓塞及肺栓塞。
Perdipine 10mg/10mL/amp (Nicardipine HCl)	適用於當口服治療不可行或不合適時、對高血壓的短期處置。

- 原缺貨品項恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛署適應症
Havrix (Hepatitis A Vaccine,inactivated) 1440 U/1mL/syringe	A型肝炎之主動免疫。