

11502-11503 新增、停用品項

新增品項

藥名	衛署適應症
Olsaa 20mg/tab (Olmesartan medoxomil)	高血壓。
Opiodur 12mcg/hr, 1.375mg/patch (Fentanyl)	需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。
Lixiana OD 30mg tab (Edoxaban)	<ol style="list-style-type: none">1. 預防非瓣膜性心房纖維顫動 (Non-Valvular Atrial Fibrillation ; NVAf) 合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞 (systemic embolism)。危險因子包括：鬱血性心臟衰竭、高血壓、年齡 ≥ 75 歲、糖尿病、先前曾發生中風或暫時性腦缺血 (transient ischemic attack ; TIA)。2. 在初始 5 到 10 日的非經腸道抗凝血藥物治療後，Lixiana 可用於治療靜脈栓塞 (Venous thromboembolism ; VTE)。靜脈栓塞包括深層靜脈栓塞 (Deep Vein Thrombosis ; DVT) 及肺栓塞 (Pulmonary Embolism ; PE)。
Flexbumin 25%, 50ml/vial (albumin human serum)	低蛋白血症、休克、燒傷。
Erleada 60mg/ tab (Apalutamide)	<ol style="list-style-type: none">1. 轉移性的去勢敏感性前列腺癌 (mCSPC)2. 非轉移性的去勢抗性前列腺癌 (nmCRPC)

停用品項

- 藥品停用

藥名	衛署適應症
CHG eye Drop 0.02% 5ml/bot (Chlorhexidine Gluconate)	棘狀阿米巴角膜炎。

Zytiga 250mg/tab (Abiraterone)	與 prednisone 或 prednisolone 併用，適用於治療下列病人： (1) 轉移性的去勢抗性前列腺癌 (CRPC)，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀而尚未需要使用化學治療。 (2) 轉移性的去勢抗性前列腺癌，且已接受過 docetaxel 治療。 (3) (3) 新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌 (CSPC)，且與雄性素去除療法併用。
Hemafer Oral Drops 50mg/mL, 30mL/bot	缺鐵性貧血。
Fentanyl Transdermal Patch 12.5mcg /h, 1.25mg/patch (Fentanyl)	需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。
Plasbumin-20, 20% 10g/50mL/bt (Human Albumin)	低蛋白血症、休克、燒傷。
Infanrix 0.5mL/syringe (Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Hib Vaccine)	針對 2 個月大以上之嬰幼兒白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺與 b 型流行性感嗜血桿菌之主動免疫。先前已接種過白喉、破傷風、百日咳(DTP)、小兒麻痺及 Hib 抗原疫苗的兒童，亦可使用 Infanrix-IPV+Hib 作為追加劑。 Infanrix-IPV+Hib 不能預防其它類型之流行性感嗜血桿菌所引起的疾病，也不能預防其它病原體所引起的腦膜炎。

● 藥品缺貨

藥名	衛署適應症
Bicillin L-A 2.4MU/4mL/syringe (Penicillin G Benzathine)	對 benzathine penicillin G 具有感受性之菌株所引起之感染症。
Miteout 5% W/W cream,30g/tube(Permethrin)	治療疥瘡感染。
Olmetec 20mg/tab (Olmesartan medoxomil)	高血壓。
Metalcaptase enteric coated tablets 300mg/tab (D-Penicillamine)	類風濕關節炎、重金屬中毒。

Lixiana F.C 30mg/tab (Edoxaban)	<p>(1) 預防非瓣膜性心房纖維顫動(Non-Valvular Atrial Fibrillation ; NVAf)合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞(systemic embolism)。危險因子包括：鬱血性心臟衰竭、高血壓、年齡≥75 歲、糖尿病、先前曾發生中風或暫時性腦缺血(transient ischemic attack ; TIA)。</p> <p>(2) 在初始 5 到 10 日的非經腸道抗凝血藥物治療後，Lixiana 可用於治療靜脈栓塞(Venous thromboembolism ; VTE)。靜脈栓塞包括深層靜脈栓塞(Deep Vein Thrombosis ; DVT)及肺栓塞(Pulmonary Embolism ; PE)。</p>
Biofermin-R 1gm/包 (Antibiotics-Resistant Lactic Acid Bacteriae)	投與下列抗生素、化學療法劑時，腸內菌叢異常所引起諸症狀之改善。例如：Penicillin 系、Cephalosporin 系、Aminoglycoside 系、Marolide 系、Tetracycline 系、Nalidixic acid 系。
Zovirax I.V for Infusion 250mg/vial (Acyclovir)	帶狀疱疹病毒及單純疱疹病毒引起之感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全之單純疱疹感染、新生兒單純疱疹感染。

● 原缺貨品項恢復供貨，替代藥品停用

藥名	衛署適應症
Dobecan 100mg/tab (Mebeverine)	原發性續發性結腸過敏合併症、腸憩室炎、腸憩室形成及區域性腸炎、膽胰運動困難、胃潰瘍、消化器官炎等症。
Hiros S.R.M.C (Cetirizine 5mg & Pseudoephedrine 120mg/cap)	緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀。
Myfungin 50mg/vial (Micafungin Sodium)	<p>適用於成人與四個月以上的兒童：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 治療念珠菌血症與其他念珠菌感染。 • 治療食道念珠菌感染。 • 預防接受造血幹細胞移植病患的念珠菌感染。
Holdipine 10mg/10ml/amp (Nicardipine HCl)	適用於當口服治療不可行或不合適時、對高血壓的短期處置。